Инструкция по применению
Ацидин-пепсин Таблетки 250 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Беларусь
Производитель: Белмедпрепараты
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бетаин+Пепсин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 250 мг
Срок годности: 18.0



Действующее вещество

Бетаин+Пепсин

Состав

1 таблетка содержит: Активные вещества: бетаин гидрохлорид (Ацидин) (в пересчете на 100% вещество) 200 мг, пепсин свиной (в пересчете на 100% пепсин) 0,5 мг. Вспомогательные вещества: повидон К-25, кремния диоксид коллоидный, кальция стеарат, сорбит (Е 420).

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Фармакокинетика. Пепсин имеет оптимальную активность при pH 1,4-2,5; при повышении pH активность снижается, при pH больше 6,0 прекращается. Разрушается в двенадцатиперстной кишке под действием ферментов поджелудочной железы. Бетаина гидрохлорид при введении в желудок легко гидролизуется с выделением свободной соляной кислоты.

Показания

Гипо - и анацидные гастриты, диспепсии.

Способ применения и дозы

Взрослым назначают по 2 таблетки 3-4 раза в сутки. Таблетки перед приемом растворить в 1 / 4-1 / 2 стакана воды. Принимают во время или после еды. Курс лечения зависит от течения заболевания и эффективности терапии и определяется врачом индивидуально в каждом случае.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, гиперацидные гастриты, повышенная кислотность желудочного сока, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастродуоденит.

Применение при беременности и кормлении грудью

Опыт применения препарата беременным и в период кормления грудью, отсутствует, поэтому не следует применять этой категории больных.

Побочные действия

Желудочно-кишечные расстройства : гастралгия, (редко) легкая тошнота и изжога, рвота, диарея. При длительном применении возможно возникновение запоров. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны. Возможно усиление проявлений побочных реакций.

Взаимодействие с другими препаратами

Эффект лекарственного средства снижается при одновременном приеме оснований (антацидов), тяжелых металлов, танина, кислотореагуючих препаратов. Пепсин разрушается под действием алкоголя.

Условия хранения

В сухом месте