Инструкция по применению
Ацикловир-акос мазь 5 % 10 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Синтез
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ацикловир
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%
Срок годности: 5



Описание

Противовирусный препарат для наружного применения.

Действующее вещество

Ацикловир

Состав

Состав на один флакон/бутылку активное вещество ацикловир (в виде натриевой соли) - 250 мг, 500 мг и 1000 мг

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

>При наружном применении системная абсорбция минимальная.

Показания

Инфекции кожи, вызванные вирусом Herpes simplex типов 1 и 2, включая генитальный герпес и герпес губ, опоясывающий лишай, ветряная оспа.

Способ применения и дозы

При лечении инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных Herpes simplex I или II, взрослым и детям старше 2 лет по 200 мг 5 раз в сутки в течение 5 дней с 4 ч интервалами в течении дня и с 8 ч интервалом на ночь (при необходимости курс может быть продлен). В составе комплексной терапии при выраженном иммунодефиците (при развернутой клинической картине ВИЧ-инфекции, включая ранние клинические проявления ВИЧ-инфекции и СПИДа), после трансплантации костного мозга по 400 мг 5 раз в сутки. Для профилактики рецидивов инфекций, вызванных Herpes simplex I или II, пациентам с нормальным иммунным статусом и при рецидиве заболевания по 200 мг 4 раза в сутки каждые 6 ч (максимальная доза до 400 мг 5 раз в сутки в зависимости от тяжести инфекции). При лечении инфекций, вызванных Varicella zoster, взрослым и детям массой более 40 кг по 800 мг 5 раз в сутки каждые 4 ч днем и с 8 ч интервалом на ночь. Продолжительность лечения 10 дней. Детям старше 2 лет по 20 мг/кг 4 раза в сутки в течение 5 дней. При лечении инфекций, вызванных Herpes zoster, взрослым по 800 мг 4 раза в сутки каждые 6 ч днем в течение 5 дней. При нарушении функции почек при лечении и профилактике инфекций, вызванных Herpes simplex, у больных с Cl креатинина менее 10 мл/мин дозу препарата снижают до 200 мг 2 раза в сутки с 12 ч интервалом. При лечении и профилактике инфекций, вызванных Varicella zoster, у больных с Cl креатинина менее 10 мл/мин дозу препарата снижают до 800 мг 2 раза в сутки с 12 ч интервалом, при Cl креатинина до 25 мл/мин по 800 мг 3 раза в сутки с 8 ч интервалом. Наружно, мазь наносят на пораженную поверхность 5 раз в сутки (через 4 ч). Продолжительность лечения 5-10 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ацикловиру и валацикловиру, детский и подростковый возраст до 18 лет. С осторожностью беременность период лактации (грудного вскармливания), дегидратация, почечная недостаточность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение ацикловира при беременности возможно в случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Определение частоты побочных реакций очень часто (1/10), часто (1/100, 1/10), нечасто (1/1000, 1/100), редко (1/10 000, 1/1000) и очень редко (10 000), частота неизвестна (частоту возникновения нельзя определить на основании имеющихся данных). Местные реакции нечасто - в месте аппликации возможно ощущение жжения, которое с временем проходит, сухость кожи, зуд. редко - эритема, контактный дерматит в месте нанесения. При попадании на слизистые оболочки возможно воспаление. Со стороны иммунной системы очень редко - анафилактические реакции, включая ангионевротический отек и крапивницу.

Взаимодействие с другими препаратами

При наружном применении ацикловира клинически значимого лекарственного взаимодействия не отмечено.

Особые указания

Ацикловир в виде лекарственных форм для наружного применения не следует наносить на слизистые оболочки полости рта, глаз, влагалища.

Условия хранения

Защищенном от света месте, беречь от детей.