Инструкция по применению
Ацикловир Белупо Крем 5 % 10 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Хорватия
Производитель: Белупо
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ацикловир
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24



Действующее вещество

Ацикловир

Состав

1 г крема для наружного применения содержит: Действующее вещество: ацикловир 50 мг. Вспомогательные вещества: пропиленгликоль – 400 мг, глицерил стеарата и макрогола-100 стеарата смесь – 15 мг, цетостеариловый спирт – 50 мг, парафин жидкий – 80 мг, парафин мягкий белый – 95 мг, натрия лаурилсульфат – 5 мг, вода очищенная – 305 мг, хлористоводородная кислота или натрия гидроксид – q.s.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

Фармакологические исследования показали минимальную системную абсорбцию при повторном применении крема ацикловир.

Показания

Лечение вирусных инфекций, вызванных вирусом Herpes simplex типов 1 и 2, включая герпес губ и кожи лица (рецидивирующий герпес губ).

Способ применения и дозы

Для наружного применения. Препарат наносят 5 раз в день (каждые 4 часа, за исключением ночного времени) тонким слоем на пораженные и граничащие с ними участки кожи. Крем наносят ватным тампоном либо чистыми руками, чтобы избежать дополнительного инфицирования пораженных участков. Важно начать лечение как можно раньше, желательно при появлении первых признаков и симптомов (в продромальном периоде или при покраснении). Лечение также может начаться на более поздних стадиях (папулы или пузыри). Терапию следует продолжать до того времени, пока на пузырьках не образуется корка, либо пока они полностью не заживут. Длительность лечения – не менее 5 дней, лечение может быть продолжено до 10 дней. В случае сохранения симптомов заболевания более 10 дней следует обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ацикловиру, валацикловиру или другим компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью Беременность, период грудного вскармливания.

Побочные действия

Частота побочных реакций классифицирована согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 и # 1/10), нечасто (≥ 1/1000 и # 1/100), редко (≥ 1/10000 и # 1/1000), очень редко (# 1/10000), частота неизвестна – по имеющимся данным установить частоту возникновения не представляется возможным. Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто – временное ощущение жжения или покалывания на участках нанесения препарата, небольшая сухость или шелушение, зуд, редко – эритема, контактный дерматит в месте нанесения, чаще связанный с реакцией на вспомогательные вещества, чем на ацикловир. Со стороны иммунной системы: очень редко – анафилактические реакции, включая ангионевротический отек и крапивницу. Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, либо вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует сообщить об этом врачу.

Передозировка

Из-за минимального системного воздействия не ожидается возникновения нежелательных эффектов при приеме внутрь или при местном нанесении всего содержимого потребительской упаковки препарата. Следует обратиться к врачу в случае подозрения на передозировку.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами Клинически значимых взаимодействий при наружном применении не выявлено.

Особые указания

Для достижения максимального терапевтического эффекта необходимо начать применять препарат как можно раньше (при первых признаках заболевания: жжение, зуд, покалывание, ощущение напряженности и покраснение). Не рекомендуется наносить на слизистые оболочки полости рта, глаз и влагалища. Избегать попадания крема в глаза, в случае контакта глаза следует промыть холодной водой. При выраженных проявлениях рецидивирующего герпеса рекомендуется проконсультироваться с врачом. Пациентам с иммунодефицитными состояниями при лечении любых инфекционных заболеваний должны следовать рекомендациям врача. Пациенты с почечной и печеночной недостаточностью Несмотря на то, что в основном ацикловир выводится почками, системная абсорбция ацикловира после наружного применения несущественна. Соответственно, нет необходимости для изменения дозы пациентам с почечными или печеночными нарушениями.

Условия хранения

В сухом месте