Инструкция по применению
АциЛакт Суппозитории вагинальные 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Фермент
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лактобактерии ацидофильные
Количество в упаковке: 10

Действующее вещество

Лактобактерии ацидофильные

Состав

1 суппозиторий препарата Ацилакт содержит: Живых ацидофильных лактобактерий – 10000000, Дополнительные ингредиенты.

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата Ацилакт не представлена.

Показания

Ацилакт применяют в гинекологической практике для лечения пациентов с заболеваниями различной этиологии, которые сопровождаются нарушением микрофлоры влагалища. При неспецифических кольпитах, дисбиозах влагалища (включая бактериальный вагиноз) препарат Ацилакт может быть назначен в качестве монотерапии или после окончания курса приема противомикробных средств. Женщинам с подострыми и хроническими формами воспалительных заболеваний шейки, придатков и тела матки препарат Ацилакт назначают после проведения антибактериальной терапии для восстановления микрофлоры. При гормонозависимых и атрофических кольпитах Ацилакт может быть назначен в качестве монотерапии или в комплексе со специфической гормональной терапией.Ацилакт в качестве профилактического средства назначают перед проведением гинекологических операций и в схемах предродовой подготовки женщинам с высоким риском развития послеоперационных и послеродовых инфекционных осложнений или дисбактериоза влагалища. При лечении урогенитальных инфекций, в том числе заболеваний, передающихся половым путем, Ацилакт назначают в комплексе со специфической антимикробной или противовирусной терапией (в частности рекомендовано включение препарата Ацилакт в схемы терапии гонореи, урогенитального герпеса и хламидиоза). В зависимости от тяжести и характера заболевания целесообразно назначение препарата Ацилакт в форме суппозиториев одновременно с пероральной формой препарата Ацилакт.

Способ применения и дозы

Суппозитории Ацилакт предназначены для интравагинального применения. Удалять упаковочный материал рекомендуется непосредственно перед введением суппозитория. Препарат Ацилакт, как правило, рекомендуется вводить глубоко во влагалище в положении лежа на спине. Перед применением препарата следует тщательно вымыть руки и очистить наружные половые органы. Продолжительность терапии и дозы препарата Ацилакт определяет врач. При атрофических вагинитах гормональной этиологии и дисбиозе влагалища, как правило, рекомендуется введение 1 суппозитория Ацилакт дважды в сутки. При нарушениях чистоты вагинального секрета у женщин в период беременности, как правило, рекомендуется назначение 1 суппозитория Ацилакт один или два раза в сутки. В качестве профилактического средства перед проведением гинекологических оперативных вмешательств и при подготовке к родам, как правило, назначают по 1 суппозиторию Ацилакт один или два раза в сутки.Средняя продолжительность терапии составляет от 5 до 10 дней. Для восстановления микрофлоры влагалища после приема антибиотиков, как правило, назначают по 1 суппозиторию Ацилакт дважды в сутки. Курс применения составляет 10 дней. В случае необходимости спустя 10-20 дней курс применения препарата Ацилакт повторяют.

Противопоказания

Не желательно назначать препарат Ацилакт женщинам, страдающим вагинальным кандидозом (в таком случае препарат Ацилакт может быть назначен для восстановления микрофлоры влагалища после проведения специфической терапии и получения отрицательных результатов микробиологических анализов).

Применение при беременности и кормлении грудью

Решение о назначении препарата Ацилакт женщинам в период лактации и беременности принимает врач.

Побочные действия

На данный момент сообщений о развитии нежелательных эффектов препарата Ацилакт в форме суппозиториев не поступало.

Передозировка

Сообщений о передозировке не поступало.

Взаимодействие с другими препаратами

Допускается сочетанное применение суппозиториев Ацилакт с противомикробными, противовирусными и иммуномодулирующими препаратами. Не желательно одновременное применение препарата Ацилакт с интравагинальными формами антибиотиков.

Особые указания

Применение суппозиториев можно сочетать с одновременным назначением антибактериальных, противовирусных и иммуномодулирующих ЛС. Не пригодны к применению суппозитории, имеющие запах прогорклого масла, или с нарушенной упаковкой.