Инструкция по применению
Ацилакт таблетки 5 доз 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Витафарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лактобактерии ацидофильные
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 12



Действующее вещество

Лактобактерии ацидофильные

Состав

Живые штаммы Lactobacillus acidophilus* не менее 107;*лиофилизированные в среде культивирования с добавление защитной сахарозно-желатино-молочной среды и спрессованные в одну таблетку;Вспомогательные вещества: лактоза, кальция стеарат, тальк.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

При заболеваниях полости рта: — воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта (глоссит, афтозный стоматит, язвенно-некротический гингивит); — патологические изменения слизистой полости рта, сопровождающие системные заболевания (красный плоский лишай, мультиформная эксудатипная эритема, болезнь Шегрена); — другие заболевания полости рта, связанные с дисбактериозом (гальванизм, множественные поражения зубов кариесом, пародонтит), подготовка к плановым челюстно-лицевым операциям с целью профилактики гнойно-воспалительных осложнений.; При заболеваниях ЖКТ: — острые кишечные инфекции, пищевые токсикоинфекции, вызванные условно-патогенными микроорганизмами или неустановленной этиологии; ротавирусный гастроэнтерит; — длительные кишечные расстройства, особенно у детей раннего возраста; — затяжные и хронические колиты и энтероколиты инфекционной и неинфекционной этиологии, сопровождающиеся нарушением микрофлоры; — среднетяжелая и легкая форма неспецифического язвенного колита у взрослых; — ослабленные, часто болеющие дети и взрослые с явлениями дисбактериоза. в том числе сопровождающегося иммунодефицитным состоянием; — комплексная терапия атонического дерматита у детей с явлениями дисбактериоза кишечника.; Корригирующую терапию ацилактом можно назначить после курса лечения бактериофагами.

Способ применения и дозы

В зависимости от заболевания препарат применяют через рот, без предварительного растворения, запивая кипяченой водой комнатной температуры или рассасывая.; Суточную дозу и продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от клинической формы заболевания и выраженности дисбактериоза.; При заболеваниях полости рта: При заболеваниях слизистой оболочки препарат применяют после еды, рассасывая таблетку.; При глоссите назначают 5 доз в сутки в 2-3 приема, курс лечения составляет 14-15 дней. При рецидивирующем афтозном стоматите и язвенно-некротическом гингивите лечение проводят по такой же схеме двумя курсами с перерывом в 7 дней.; При патологических процессах в полости рта, обусловленных системными заболеваниями, назначают по 10 доз в сутки в 4 приема двумя курсами по 14-15 дней каждый с перерывом в 7 дней.; При заболеваниях ЖКТ: Таблетированный препарат принимают внутрь не позднее, чем за 20-30 мин до еды, запивая водой.; Больным с кишечными расстройствами назначают по 5 доз 2-3 раза в сутки.; При острых воспалительных процессах кишечника курс лечения составляет 7-8 дней, при затяжных и рецидивирующих формах заболевания - 14-21 день.; При необходимости врач назначает повторные курсы под контролем лабораторных показателей.; При нарушениях нормальной микрофлоры кишечника у детей с атопическим дерматитом по 5 доз в сутки курсами 20 - 25 дней, с перерывами в 1,5 - 2 мес. Количество курсов определяется состоянием кожного покрова и нормализацией микрофлоры кишечника.

Противопоказания

Не установлены.

Применение при беременности и кормлении грудью

Лактобактерии являются представителями нормальной микрофлоры человека. Поэтому, препараты, изготовленные на их основе, могут применяться при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Не выявлены.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение таблеток возможно сочетать с одновременным проведением антибактериальной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии.

Особые указания

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: Препарат не влияет на выполнение видов деятельности требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами, машинным оборудованием и т.п.).

Условия хранения

В сухом месте