Инструкция по применению
Аципол Форте Капсулы массой 235 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Лекко
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10



Описание

АЦИПОЛ ФОРТЕ - Биологически активная добавка (БАД) к пище - комбинация живых пробиотических лакто- и бифидобактерий (10 млрд в каждой капсуле) и цинка для взрослых и детей с 3 лет.Внешний вид и свойства: белые капсулы с содержимым от светло-кремового до светло-коричневого цвета.БАД «Аципол® Форте» отличается:1. Сбалансированным составом: 5 млрд лактобактерий rhamnosus GG, 5 млрд бифидобактерий longum - наиболее хорошо изученных, широко применяемым во всем мире1, и микроэлемент цинк, известный своим положительным влиянием на иммунную систему.2. Универсальностью: действие штаммов, входящих в состав БАД «Аципол® Форте», направлено на восстановление баланса микрофлоры кишечника и поддержание функции иммунной системы.3. Удобством приёма: 1 капсула 1 раз в день, капсулу можно вскрыть и смешать с жидкостью или едой, хранить без холодильника.4. Безопасностью: разрешён для детей с 3 лет, а также в период беременности и грудного вскармливания.Состояние микрофлоры кишечника является основой как физического, так и эмоционального здоровья. Сдвиг баланса между полезными и условно-патогенными бактериями лежит в основе многих хронических заболеваний. При этом нарушение этого равновесия именуется дисбактериозом кишечника. Причин, нарушающих баланс кишечной микрофлоры и приводящих к дисбактериозу, может быть много: приём лекарственных препаратов, стресс, несбалансированное питание, заболевания желудочно-кишечного тракта, смена климатических условий и рациона питания, нарушение биоритмов, дальние поездки,

снижение иммунитета. 2Проявления дисбактериоза кишечника неспецифичны3. У детей нарушение баланса микрофлоры кишечника может быть связано с появлением избыточного газообразования и срыгивания, нарушением стула (запор/диарея), частыми простудными заболеваниями, появлением признаков атопии.4 Возможными сигналами о сдвигах в нормальном балансе микрофлоры кишечника являются, беспокоящее чувство урчания в животе, отрыжку и неприятный вкус во рту, аллергические проявления, нарушение всасывания нутриентов, снижение иммунитета5.Как помочь своему организму при нарушении баланса нормальной микрофлоры кишечника? Особое внимание стоит уделить пробиотикам - живым микроорганизмам, которые при применении в адекватных количествах вызывают улучшение состояния здоровья организма - хозяина. Они играют важную роль в снижении риска возникновения кишечных инфекций, подавляя рост патогенных микроорганизмов и препятствуя повреждению слизистой оболочки кишечника. Кроме того, пробиотики применяют для поддержания иммунной системы, с целью повышения защитных сил организма.В состав БАД «Ацилол® Форте» входят два пробиотических микроорганизма - бифидобактерии (Bifidobacterium longum CECT 7894) и лактобактерии (Lactobacillus rhamnosus ATCC 53103).Лактобактерии широко используются для нормализации функций пищеварительного тракта, способствуя восстановлению нормальной микрофлоры кишечника. За счет образования ассоциации с клетками слизистой оболочки кишечника, лактобактерии участвуют в формировании местного иммунитета. Лактобактерии в процессе своей жизнедеятельности синтезируют компоненты, которые обеспечивают антибактериальный эффект по отношению к представителям патогенной и условно-патогенной флоры. Кроме того, лактобактерии участвуют в синтезе аминокислот, белков, витаминов B1, B2, B6, B12, K, никотиновой и фолиевой кислоты, а также веществ с антиоксидантной активностью.Бифидобактерии составляют основу микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека и активно участвуют в процессе пищеварения. Синтезируемые бифидобактериями жирные кислоты (молочная и уксусная) оказывают положительное влияние на физиологические функции организма: они препятствуют размножению патогенной, гнилостной и газообразующей микрофлоры. Бифидобактерии способны создавать молекулы с антимикробной активностью в отношении многих видов патогенных микроорганизмов. Бифидобактерии являются «поставщиком» ряда незаменимых элементов, в том числе аминокислот, оказывая защитное действие и влияя на синтез ряда иммунных клеток организма.Кроме того, Bifidobacterium longum и Lactobacillus rhamnosus, входящие в состав БАД «Ацилол® Форте», участвуют в образовании короткоцепочечных жирных кислот (молочная, уксусная, масляная, пропионовая), в присутствии которых тормозится развитие условно-патогенной микрофлоры.

Состав

наполнитель мальтодекстрин, наполнитель гипромеллоза, лактобактерии Lactobacillus rhamnosus ATCC 53103, бифидобактерии Bifidobacterium longum CECT 7894, цинка цитрата тригидрат, желирующий агент геллановая камедь, краситель титана диоксид (E 171).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника пробиотических микроорганизмов (лактобактерии и бифидобактерии) и цинка, которые комплексно способствуют восстановлению баланса микрофлоры кишечника и укреплению иммунитета. Компоненты БАД «Ацилол® Форте» способствуют снижению рисков развития нарушений баланса микрофлоры кишечника, которые могут встречаться при различных состояниях, таких как: \- применение различных лекарственных средств, в том числе антибактериальных препаратов; \- при нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта ввиду различных причин, в т.ч при погрешностях в питании; \- при снижении защитной функции иммунной системы.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время приема пищи. Детям с 3 лет и взрослым принимать по 1 капсуле 1 раз в день во время еды в течение 10 - 14 дней. Содержимое капсулы можно смешать с жидкостью или едой. При необходимости прием БАД Ацилол® Форте можно продлить до 1 месяца. При необходимости продолжительность и схема применения может быть индивидуально изменена по рекомендации врача. Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

от 2# до 25#