Инструкция по применению
Аципол Капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лактобактерии ацидофильные+Грибки кефирные
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 24.0

Описание

Капсулы твердые желатиновые № 3 оранжевого цвета. Содержимое капсулы – порошок от светло-кремового до светло-коричневого цвета с кисломолочным запахом.

Действующее вещество

Лактобактерии ацидофильные+Грибки кефирные

Состав

Действующие вещества: Лактобактерии ацидофильные живые – не менее 10 000 000 КОЕ, биомасса кефирного грибка инактивированная – 0,4 мг. Вспомогательные вещества: капсулы твердые желатиновые № 3 - 48,0 мг. Корпус и крышечка: Титана диоксид (Е 171) – 1,0 % Оксид железа красный (Е 172) – 0,3 % Оксид железа желтый (Е 172) – 0,1 % Желатин – до 100 %

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Компоненты препарата не всасываются из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и не оказывают системного действия.

Показания

Ацилол применяют у взрослых и детей с 3 месяцев в комплексном лечении дисбактериоза кишечника на фоне: Острых кишечных инфекций Хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как колит, энтероколит инфекционного и неинфекционного происхождения Длительной антибактериальной терапии Профилактика дисбактериоза Повышение общей резистентности организма

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 3-х лет – капсулы следует принимать, не разжевывая, запивать кипяченой водой. Детям в возрасте от 3-х месяцев до 3-х лет Ацилол® следует принимать вместе с пищей, предварительно вскрыв капсулу и растворив ее содержимое в молоке или кипяченой воде. Для лечения дисбактериоза Ацилол® назначают: Детям в возрасте от 3-х месяцев до 3-х лет - по 1 капсуле 2-3 раза в сутки, вместе с пищей. Детям старше 3-х лет и взрослым - по 1 капсуле 3-4 раза в сутки, за 30 минут до приема пиши. Продолжительность курса терапии дисбактериоза при острых кишечных инфекциях - 5-8 дней. Более длительные курсы возможны по назначению врача при хроническом течении заболеваний, сопровождающихся дисбактериозом. Для профилактики дисбактериоза Ацилол® назначают: по 1 капсуле 1 раз в сутки в течение 10-15 дней. Повторные курсы терапии и профилактики проводят не ранее 1 месяца после окончания предыдущего курса. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 месяцев.

Применение при беременности и кормлении грудью

Компоненты препарата действуют в просвете ЖКТ и не всасываются в системный кровоток, поэтому применение препарата в период беременности и грудного вскармливания не противопоказано и возможно по согласованию с лечащим врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно одновременное применение с антибактериальными, противовирусными и иммуномодулирующими препаратами.

Особые указания

Необходимо соблюдать рекомендованную в инструкции схему и длительность приема препарата. Изменение суточной дозы и продолжительности лечения возможно по назначению врача, в зависимости от возраста пациента, тяжести и длительности заболевания.

Срок хранения после открытия

2 года.