Инструкция по применению
Адаптол Таблетки 500 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Латвия
Производитель: OlainFarm
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тетраметилтетраазабициклооктандион
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 48.0

Действующее вещество

Тетраметилтетраазабициклооктандион

Состав

Действующее вещество: Тетраметилтетраазабициклооктандион - 500 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Неврозы и неврозоподобные состояния (раздражительность, эмоциональная неустойчивость, тревога и страх), для улучшения переносимости нейролептиков и транквилизаторов с целью устранения вызываемых ими соматовегетативных и неврологических побочных эффектов, кардиалгия различного генеза (не связанная с ИБС), никотиновая абстиненция (в составе комплексной терапии в качестве средства, снижающего влечение к курению табака).

Способ применения и дозы

Препарат следует принимать внутрь независимо от приема пищи по 500 мг 2-3 раза /сут. Максимальная разовая доза составляет 3 г, суточная - 10 г. Длительность курса лечения &mdash, от нескольких дней до 2-3 мес. В комплексной терапии в качестве средства, снижающего влечение к курению табака, назначают по 500-1000 мг 3 раза /сут в течение 5-6 недель.

Противопоказания

Беременность, период лактации (грудного вскармливания), повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Редко: головокружение, понижение АД, диспептические расстройства, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд). При применении в высоких дозах: бронхоспазм, понижение температуры тела, слабость.

Передозировка

Препарат малотоксичен. Типичная клиническая картина передозировки отсутствует. Проявления тяжелых отравлений не зарегистрированы. Симптомы: возможны слабость, артериальная гипотензия, головокружение. Лечение: при подозрении на передозировку следует провести промывание желудка, симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно одновременное применение Адаптола с нейролептиками, транквилизаторами (в т.ч. бензодиазепинами), снотворными средствами, антидепрессантами и психостимуляторами.

Особые указания

При понижении АД и/или температуры тела (возможно на 1-1.5&deg,C) прием препарата прекращать не требуется. АД и температура тела нормализуются самостоятельно. Привыкание, зависимость (психическая и физическая) и синдром отмены при применении препарата Адаптол не установлены. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Препарат способен вызывать понижение АД и слабость, что может отрицательно повлиять на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, занимающихся потенциально опасными видами деятельности.

Условия хранения

В сухом месте