Инструкция по применению
Адиарин Защита кишечника Порошок для приготовления раствора для приема внутрь саше 250 мг 8 шт

Характеристики

Форма выпуска: Саше
Страна: Швейцария
Производитель: Ядран
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 8



Описание

Изделие медицинское для защиты слизистой оболочки кишечника “Адиарин®” предназначено для защиты слизистой оболочки кишечника от проникновения бактерий и токсинов. Уникальное средство для устранения диареи в форме порошка в саше. Инновационное действующее вещество - желатина таннат - мукопротектор* нового поколения, создающий на поверхности слизистой кишечника специальный биобарьер и восстанавливающий ее физиологическую функцию. Действующий компонент Адиарин® - Желатина таннат - это стабильный комплекс двух веществ: желатина и таниновой кислоты, сырье для которой получают из молодых ветвей дуба и сумаха, из плодов семянок цезальпинии колючей. Функциональное назначение изделия медицинского для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®” не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. Изделие медицинское для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®” обладает способностью к механическому воздействию, защищая плотные межклеточные соединения эпителиальных клеток в тех случаях, когда они проявляют несостоятельность или разрушены, тем самым предотвращая массовое поступление в слизистую оболочку кишечника бактерий и токсинов из просвета кишечника. Данный эффект обеспечивается за счет механического создания на поверхности слизистой оболочки кишечника защитного слоя.

Состав

1 саше содержит желатина таннат 250 мг.

Форма выпуска

Саше

Показания

Рекомендован для защиты слизистой оболочки кишечника при диарее для детей от 3 месяцев и взрослых.

Способ применения и дозы

Содержимое пакетика высыпать в столовую ложку, смешать с небольшим количеством воды и в таком виде употребить. Или растворить содержимое пакетика в 50-100 мл кипячёной воды, охлаждённой до комнатной температуры, и полученную суспензию употребить вместе с образовавшимся осадком. Рекомендации по применению для разных категорий пациентов: Возраст с 3 месяцев до 3 лет: Количество, необходимое для одного применения - 1 пакетик. От 3 до 14 лет: Количество, необходимое для одного применения - от 1 до 2 пакетиков. Старше 14 лет: Количество, необходимое для одного применения - 2 пакетика. Интервал применения: от 4 до 6 часов. Время прекращения применения восстановление физиологической функции стенки кишечника.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Взаимодействие с другими препаратами

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.