Инструкция по применению
Адиарин Регидро 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Порошок
Страна: Хорватия
Производитель: Ядран
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 24.0

Описание

Специализированная смесь для приготовления гипоосмолярного солевого раствора для регидратации. Профилактика обезвоживания и быстрое восполнение потерь воды и электролитов при диарее. Продукт диетического (лечебного) питания для детей с первых дней жизни и взрослых, Адиарин® Регидро представляет собой сухую быстрорастворимую смесь, предназначенную для питания детей раннего возраста при обезвоживании организма различной степени тяжести при остром и хроническом диарейном синдроме. Продукт предназначен для коррекции водно-электролитного баланса: предупреждает и уменьшает обезвоживание, восстанавливая потерю воды, натрия и калия, водно-электролитное и кислотно-щелочное равновесие, нарушенное при обезвоживании. По пищевой ценности и содержанию минеральных веществ продукт соответствует стандартам Европейского общества педиатров, гастроэнтерологов и диетологов (ESPGAN) и ВОЗ.

Состав

Глюкоза, натрия цитрат, натрия хлорид, калия хлорид, диоксид кремния, аминокислотный хелат цинка (мальтодекстрин, цинка бисглицинат хелат, целлюлоза, глицин, натрия карбонат, вода). Осмолярность: 245 мОсмоль/л. Таблица пищевой ценности продуктаВ 100 г продуктаВ 1 сашеЭнергетическая ценность1126,2 кДж/265 ккал48,4 кДж/11,4 ккалУглеводы66 г2,84 гГлюкоза65,74 г2,82 гХлориды10,54 г0,453 г

Форма выпуска

Порошок

Показания

Для лечебного питания детей с первых дней жизни и взрослых при обезвоживании организма различной степени тяжести при остром и хроническом диарейном синдроме.

Способ применения и дозы

содержимое 1 саше регидратационной соли необходимо растворить в 200 мл кипяченой воды комнатной температуры и тщательно перемешать. Выпивают приготовленный раствор небольшими глотками. С помощью врача необходимо определить количество регидратационного раствора, которое необходимо принять, в зависимости от уровня обезвоживания.   Схема выпаивания в первые 4-6 часов обезвоживания Количество регидратационного раствора за один прием (в мл) Масса тела (кг) легкая степень средняя степень До 6 3-6 приемов по 50 мл 4-8 приемов по 50 мл 50 6-9 6-9 приемов по 50 мл 8-12 приемов по 50 мл 50 9-12 4-6 приемов по 100 мл 6-8 приемов по 100 мл 100 12-15 4-5 приемов по 150 мл 5-6 приемов по 150 мл 150 15-30 3-7 приемов по 200 мл 5-10 приемов по 200 мл 200 свыше 30 и взрослые 3-8 приемов по 400 мл 5-10 приемов по 400 мл 400 При назначении регидратационного раствора младенцам и детям, рекомендуется продолжать кормление грудью или кормление детскими молочными смесями. Младенцам регидратационный раствор дают чайными ложками, детям постарше - небольшими порциями. В случае возникновения рвоты следует подождать 10-20 минут и повторить прием дозы регидратационного раствора. Адиарин® Регидро следует принимать с момента появления первых признаков обезвоживания и до тех пор, пока длится диарея. Для грудных детей и детей младшего школьного возраста - не менее 24 часов, для детей старшего возраста и взрослых - не менее 36 часов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Срок хранения после открытия

24.0

Условия хранения

Беречь от детей