Инструкция по применению
Адисорд Капсулы 200 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: КАНОНФАРМА ПРОДАКШН
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нифуроксазид
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 200 мг



Описание

Твердые желатиновые капсулы № 0: корпус и крышечка желтого цвета (дозировка 200 мг).Содержимое капсул - смесь гранул и порошка желтого цвета. Допускаются включения спрессованной массы желтого цвета, рассыпающиеся при легком нажатии.

Действующее вещество

Нифуроксазид

Состав

1 капсула содержит:активное вещество: нифуроксазид 200 мг,вспомогательные вещества: кальция гидрофосфата дигидрат 50 мг, крахмал кукурузный прежелатинизированный 66 мг, маннитол 40 мг, магния стеарат 2 мг, тальк 2 мг, капсула твердая желатиновая №0:корпус - титана диоксид 0,7867 мг, желатин 57,6681 мг, краситель хинолиновый желтый 0,5426 мг, краситель солнечный закат желтый 0,0026 мг.крышечка - титана диоксид 0,4933 мг, желатин 36,1648 мг, краситель хинолиновый желтый 0,3403 мг, краситель солнечный закат желтый 0,0016 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После перорального приема нифуроксазид практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта и не оказывает системного действия, 99% принятой дозы остается в кишечнике и оказывает там свое противомикробное действие. Выводится кишечником.

Показания

Диарея бактериального генеза без признаков глистной инвазии.

Способ применения и дозы

1 капсула содержит:активное вещество: нифуроксазид 200 мг,вспомогательные вещества: кальция гидрофосфата дигидрат 50 мг, крахмал кукурузный прежелатинизированный 66 мг, маннитол 40 мг, магния стеарат 2 мг, тальк 2 мг, капсула твердая желатиновая №0:корпус - титана диоксид 0,7867 мг, желатин 57,6681 мг, краситель хинолиновый желтый 0,5426 мг, краситель солнечный закат желтый 0,0026 мг.крышечка - титана диоксид 0,4933 мг, желатин 36,1648 мг, краситель хинолиновый желтый 0,3403 мг, краситель солнечный закат желтый 0,0016 мг.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нифуроксазиду, производным нитрофурана или любым вспомогательным веществам препарата,детский возраст до 3 лет.

Побочные действия

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, отек Квинке, одышка, анафилактический шок). Общие расстройства и нарушения в месте введения: боль в животе, тошнота, усиление диареи, гранулоцитопения.Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, отек Квинке, одышка, анафилактический шок). Общие расстройства и нарушения в месте введения: боль в животе, тошнота, усиление диареи, гранулоцитопения.Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном приеме с этанолом возможно развитие дисульфирамоподобной реакции (боль в животе, тошнота, рвота, головная боль, тахикардия, нечеткое зрение, слабость, судороги). Не рекомендуется одновременное применение с препаратами, угнетающими функцию центральной нервной системы.

Особые указания

При необходимости следует проводить регидратацию. Объем вводимой жидкости и способ ее введения (парентерально, внутривенно) должен соответствовать степени выраженности диареи, возрасту и клиническому состоянию больного.В случае бактериальной диареи с признаками системного поражения (ухудшение общего состояния, повышение температуры тела, симптомы интоксикации или инфекции) следует обратиться к врачу о решении вопроса о применении противомикробных препаратов системного действия.Во время терапии нифуроксазидом запрещено употребление алкоголя.При появлении симптомов аллергической реакции (в том числе одышка, кожная сыпь, зуд) следует прекратить прием препарата.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат Адисорд® не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами или занятию другими потенциально опасными видами деятельности.

Условия хранения

При одновременном приеме с этанолом возможно развитие дисульфирамоподобной реакции (боль в животе, тошнота, рвота, головная боль, тахикардия, нечеткое зрение, слабость, судороги). Не рекомендуется одновременное применение с препаратами, угнетающими функцию центральной нервной системы.