Инструкция по применению
Адонис-бром Таблетки 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Калия бромид+горецвет
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 0.06907 г +0.25 г
Срок годности: 36.0

Описание

Таблетки, покрытые оболочкой, желтого цвета, с двояковыпуклой поверхностью, ядро серо-зеленого цвета, на поперечном разрезе видны два слоя.

Действующее вещество

Калия бромид+горецвет

Состав

Активные компоненты: Адониса экстракта густого 0,06907 г Калия бромида 0,25 г Вспомогательные вещества: магния карбонат основной (магния гидрокарбонат), крахмал картофельный, сахар рафинированный, тальк, кальция стеарат, аэросил (кремния диоксид коллоидный), титана диоксид, желатин пищевой, воск пчелиный, парафин, подсолнечное масло, хинолиновый желтый.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

Невротический синдром, в том числе сопровождающийся тахикардией.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженная брадикардия, атриовентрикулярная блокада различной степени, синдром Адамса-Стокса-Морганьи, стенокардия.

Побочные действия

Аллергические реакции, тошнота, рвота, при длительном применении - кашель, насморк, общая слабость, снижение памяти, кожная сыпь, конъюнктивит. При приеме препарата в больших дозах возможны потеря аппетита, диарея, головная боль, депрессивные явления, нарушения зрения.

Передозировка

Симптомы: выраженная брадикардия, политопная экстрасистолия, бигеминия или тригеминия, замедление предсердно-желудочковой проводимости, в тяжелых случаях - трепетание желудочков, остановка сердца. При интоксикации, связанной с передозировкой препаратами сердечных гликозидов, делают перерыв в их применении, при необходимости назначают препараты калия и антиаритмические препараты.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему, что требует коррекции доз при одновременном применении.

Условия хранения

В сухом месте