Инструкция по применению
Адрианол Капли назальные для детей 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Югославия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Трамазолин+Фенилэфрин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,5 мг+0,5 мг/1 мл
Срок годности: 2

Описание

Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике

Действующее вещество

Трамазолин+Фенилэфрин

Состав

Фенилэфрина гидрохлорид 0.5 мг, леримазолина гидрохлорид 0.5 мг. Вспомогательные вещества: метилцеллюлоза М.Н.В. 10000 - 1.32 мг, бензалкония хлорид - 0.2 мг, глицерол - 0.015 мг, лимонной кислоты моногидрат - 5.72 мг, натрия гидрофосфата дигидрат - 8.11 мг, вода очищенная - до 1 мл.

Форма выпуска

Капли

Показания

Острый и хронический ринит, синусит, применяется в качестве вспомогательного противоотечного средства во время диагностических процедур и хирургических манипуляций.

Способ применения и дозы

Дети с 3 лет (капли назальные для детей): по 2 капли в каждый носовой ход 3 раза в сутки. Взрослые и дети с 7 лет (капли назальные): по 1-3 капли в каждый носовой ход 4 раза в сутки. Длительность применения препарата - не более 1 недели, затем необходим перерыв на несколько дней.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность, тиреотоксикоз, феохромоцитома, глаукома, тяжелые поражения почек, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атрофический ринит, общий атеросклероз, детский возраст до 3 лет (капли назальные для детей), детский возраст до 7 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение нафазолина при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только по строгим показаниям в тех случаях, когда ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск развития побочных эффектов у плода или ребенка.

Побочные действия

Местные реакции: жжение, болезненность или сухость слизистой оболочки носа, отек слизистой оболочки полости носа, обильные выделения, нарушение вкусовой чувствительности. Системные реакции: тошнота, головокружение, головная боль, тахикардия, повышение АД, аллергические реакции. При длительном применении: ринит, заложенность носа, атрофия слизистой оболочки носа.

Передозировка

Симптомы: утомляемость, головокружение, тошнота, бессонница, повышение АД, тахикардия, лихорадка, шок, рефлекторная брадикардия.

Взаимодействие с другими препаратами

В комбинации с антидепрессантами и ингибиторами МАО повышается риск артериальной гипертензии.

Особые указания

При длительном применении выраженность сосудосуживающего действия постепенно снижается (явление тахифилаксии), поэтому не следует применять в течение длительного времени, например, при хроническом рините.

Условия хранения

Беречь от детей. При комнатной температуре.