Инструкция по применению
Аджидерилин Крем для наружного применения 1% 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Индия
Производитель: Аджио Фармасьютикалз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 1



Описание

Однородный крем от белого до почти белого цвета с характерным запахом.

Действующее вещество

Нафтифин

Состав

Состав на 1 г Действующее вещество: нафтифина гидрохлорид- 10 мг. Вспомогательные вещества: натрия гидроксид- 1,5 мг, бензиловым спирт- 10,0 мг, сорбитана моностеарат- 19,0 мг, цетилпальмитат- 20,0 мг, цетиловый спирт- 40,0 мг, стеариновый спирт- 40,0 мг, полисорбат 60- 61,0 мг, изопропилмиристат- 80,0 мг, вода очищенная- до 1 г.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

При наружном применении Нафтифин хорошо проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в различных ее слоях. После нанесения на кожу системной абсорбции подвергается менее 6% нафтифина. Всосавшееся количество частично подвергается метаболизму и выводится почками и через кишечник. Период полувыведения нафтифина составляет 2-3 дня.

Показания

Грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea corporis, tinea inquinalis) межпальцевые микозы (tinea manum, tinea pedum) грибковые инфекции ногтей (онихомикозы) кандидозы кожи разноцветный (отрубевидный) лишай дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него).

Способ применения и дозы

Наружно. При поражении кожи Препарат АДЖИДЕРИЛИН наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и прилегающие к ней участки (приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания. Длительность терапии при дерматомикозах- 2-4 недели (при необходимости до 8 недель), при кандидозах- 4 недели. При поражении ногтей Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Препарат АДЖИДЕРИЛИН наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Длительность лечения при онихомикозах- до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нафтифину или другим компонентам препарата беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность применения не установлены).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (безопасность и эффективность применения у данной категории пациентов не изучена).

Побочные действия

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи (покраснение) и жжение. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены лечения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по медицинскому применению передозировка маловероятна. При случайном проглатывании внутрь показано промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось.

Особые указания

Для достижения терапевтического эффекта требуется курсовое лечение. Препарат АДЖИДЕРИЛИН не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания препарата в глаза. С осторожностью следует применять препарат у детей. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат АДЖИДЕРИЛИН не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.