Инструкция по применению
Аджиколд Плюс мазь 20 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Индия
Производитель: Coswell
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Камфора+Ментол+Эвкалиптовое масло
Количество в упаковке: 1



Описание

Аджиколд-Плюс мазь - комбинированный препарат растительного происхождения. Оказывает противовоспалительное, местнораздражающее, отхаркивающее, бронхолитическое и противокашлевое действие. Раздражая рецепторы слизистых оболочек и кожи, способствует высвобождению энкефалинов, эндорфинов и других пептидов, регулирующих болевую чувствительность и проницаемость сосудов. Стимулирует реснитчатый эпителий слизистых оболочек, усиливает секрецию слизистой оболочки бронхов, способствует разжижению и быстрому выведению мокроты из дыхательных путей. Местнораздражающее действие выражается в возбуждении окончаний чувствительных нервов в коже, вызывает местные и рефлекторные реакции, способствующие улучшению кровоснабжения и трофики тканей, ослаблению болей. В механизме действия играет роль также и местное освобождение биологически активных веществ-аутакоидов - кининов, гистамина, простагландинов и др. Раздражение рецепторов слизистых оболочек, кожи и подкожных образований сопровождается образованием и высвобождением энкефалинов, эндорфинов, динорфинов и других пептидов, имеющих большое значение для восприятия болевых ощущений, изменением проницаемости сосудов, клеточной и тканевой реактивности. Некоторые "местные" средства в той или иной степени всасываются и могут вызывать резорбтивный системный эффект, влиять на различные регуляторные процессы, включая нейромедиаторные и иммунные. Интегральное местно-рефлекторное действие раздражающих веществ сопровождается расширением сосудов (улучшается трофика тканей и отток жидкости) в области применения и сегментарно расположенных внутренних органах и мышцах ("разрешающее" действие на патологические процессы в этих органах), ослаблением болевых ощущений, исходящих из этих же органов ("отвлекающее" действие).

Действующее вещество

Камфора+Ментол+Эвкалиптовое масло

Форма выпуска

Мазь

Показания

Применяется в комплексной терапии:— инфекционно-воспалительных заболеваний (в т. ч. простудных) верхних и нижних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, насморком, чувством заложенности носа. — при мышечных болях. — при невралгиях.

Способ применения и дозы

Наружно. При инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей: небольшое количество мази наносят 2 раза/сут на верхнюю часть груди, шеи и спины и энергично растирают. После растирания необходимо находиться в тепле. Мышечные боли, невралгии: небольшое количество мази наносят 2 раза/сут на кожу над болезненными участками и энергично растирают. После растирания необходимо находиться в тепле. При рините (насморке): необходимо растворить 1 чайную ложку мази в 200 мл (1 стакан) очень горячей воды и вдыхать 2 раза в день. Не нагревать во время ингаляции. Приготовленный раствор для ингаляций не использовать повторно.

Противопоказания

— склонность к бронхоспазму. — судороги в анамнезе. — повреждения кожных покровов в области предполагаемого нанесения препарата. — детский возраст до 2 лет. — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью: период беременности и лактации.

Побочные действия

Входящие в состав препарата ментол и эфирные масла могут приводить к развитию реакции гиперчувствительности, включая контактный дерматит. При случайном приеме препарата внутрь возможно развитие таких побочных эффектов, как: тошнота, рвота, боль в животе, диарея, сонливость. В случае возникновения вышеперечисленных симптомов рекомендуется обратиться к врачу.

Передозировка

При наружном применении случаев передозировки не зарегистрировано. Симптомы при случайном приеме внутрь: тошнота, рвота, спастические боли в животе, головная боль, выраженное головокружение, покраснение кожи лица, затруднение дыхания, делирий, судороги, угнетение ЦНС и кома. Лечение: прием активированного угля, солевого слабительного и промывание желудка. Судороги можно купировать медленным внутривенным введением диазепама или, при необходимости, барбитуратов короткого действия.

Взаимодействие с другими препаратами

Сведения о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания

Категорически запрещается наносить мазь на слизистые оболочки (в особенности носа и полости рта), на ожоговые поверхности или поврежденную кожу. Следует избегать попадания препарата в глаза. При случайном попадании препарата в глаза или на слизистые оболочки полости носа и рта промыть холодной водой.