**Инструкция по применению**
**Аэртал Таблетки 100 мг 10 шт**




### Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Венгрия
Производитель: Гедеон Рихтер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ацеклофенак
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 36

### Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета. На одной стороне выгравирована буква «А».

### Действующее вещество

Ацеклофенак

### Форма выпуска

Таблетки

### Показания

Аэртал® показан к применению у взрослых пациентов в возрасте от 18 лет. \- При остеоартрите, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сопровождающихся болью (например, плечелопаточный периартрит). \- Для устранения боли различной этиологии (в том числе, поясничная, зубная боль и первичная дисменорея). Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**Передозировка**

**Если Вы приняли препарата Аэртал® больше, чем следовало** Возможные симптомы передозировки - тошнота, рвота, боль в области желудка, головокружение, слабость и головная боль. Прием активированного угля может замедлить всасывание ацеклофенака. Немедленно обратитесь за медицинской помощью к врачу или в отделение неотложной помощи ближайшей больницы. Возьмите с собой листок-вкладыш препарата. **Если Вы забыли принять препарат Аэртал®** Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Примите следующую дозу в обычное время. **Если Вы прекратили прием препарата Аэртал®** Продолжительность лечения определяет врач. Если Вы самостоятельно досрочно прекратите лечение, то симптомы заболевания могут вернуться. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

**Особые указания**

Следует воздержаться от управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, так как препарат может вызывать головокружение и другие нежелательные эффекты, которые могут влиять на указанные способности.

**Условия хранения**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на блистерной упаковке и картонной пачке. Датой истечения срока годности является последний день месяца. Хранить при температуре не выше 25 °C.