Инструкция по применению
Аевит капсулы 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10



Описание

Капсулы желатиновые сферической формы, от темно-желтого до светло- коричневого цвета, имеющие гладкую поверхность, без повреждений и видимых воздушных включений. Заполнены маслянистой жидкостью от светло-желтого до темно-желтого цвета, без прогорклого запаха.

Состав

Действующие вещества: Ретинола пальмитат (витамин А) - 55 мг (100000 МЕ) альфа-Токоферола ацетат (витамин Е) - 100 мг Вспомогательные вещества: Масло кукурузное - 45 мг Масса содержимого капсулы - 200 мг Оболочка капсулы: Желатин - 26,83 мг Глицерол (глицерин) - 7,56 мг Метилпарагидроксибензоат (метилпарабен) - 0,01 мг Сорбитол (сорбит) - 4,94 мг Вода очищенная - 0,65 мг Краситель Коричневый НТ (Е 155) - 0,01 мг Масса капсулы - 240 мг

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Комбинированный препарат действие которого определяется свойствами входящих в его состав витаминов А и Е. Ретинол (витамин А) участвует в формировании зрительных пигментов необходимых для нормального сумеречного и цветового зрения, обеспечивает целостность эпителиальных тканей регулирует рост костей. Токоферол (витамин Е) обладает антиоксидантными свойствами обеспечивает защиту ненасыщенных жирных кислот в мембранах от липопероксидации, участвует в формировании межклеточного вещества коллагеновых и эластических волокон соединительной ткани гладкой мускулатуры сосудов пищеварительного тракта. АЕВИТ восстанавливает нарушенное капиллярное кровообращение нормализует капиллярную и тканевую проницаемость повышает устойчивость тканей к гипоксии.

Показания

Авитаминоз А Е. В комплексной терапии: - поражений и заболеваний кожи сопровождающихся нарушением трофики тканей (псориаз некоторые формы экземы ихтиоз себорейный дерматит), - облитерирующего эндартериита.

Способ применения и дозы

Применяют только по рекомендации врача. Внутрь. По 1 капсуле в день независимо от приема пищи. Курс лечения - 30-40 дней. Возможно проведение повторного курса лечения после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата гипервитаминоз А и/или Е детский возраст до 18 лет беременность период лактации.

Побочные действия

Аллергические реакции (кожная сыпь) редко - ощущение дискомфорта в эпигастральной области тошнота диарея. При длительном приеме возможно обострение желчекаменной болезни и хронического панкреатита.

Передозировка

Симптомы острой передозировки (развиваются через 6 часов после приема): гипервитаминоз А: у взрослых - сонливость вялость двоение в глазах головокружение сильная головная боль тошнота неукротимая рвота диарея раздражительность кровоточивость десен сухость и изъязвление слизистой оболочки полости рта шелушение губ кожи (особенно ладоней) спутанность сознания повышение внутричерепного давления (у детей грудного возраста - гидроцефалия выпячивание родничка). Симптомы хронической интоксикации: потеря аппетита боль в костях трещины и сухость кожи сухость слизистой оболочки полости рта губ гастралгия рвота гипертермия астения чрезмерная утомляемость головная боль фоточувствительность поллакиурия никтурия полиурия раздражительность выпадение волос желто-оранжевые пятна на подошвах ладонях в области носогубного треугольника гепатотоксические явления внутриглазная гипертензия олигоменорея портальная гипертензия гемолитическая анемия изменения на рентгенограммах костей судороги. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия. Симптомы передозировки витамина Е: при приеме в течение длительного периода в дозах 400- 800 ЕД в сутки - нечеткость зрительного восприятия головокружение головная боль тошнота диарея гастралгия астения, при приеме более чем 800 ЕД в сутки в течение длительного периода - увеличение риска кровотечений у больных с гиповитаминозом К нарушение метаболизма тиреоидных гормонов расстройства сексуальной функции тромбофлебит некротический колит сепсис гепатомегалия гемморагический инсульт асцит. Лечение: отмена препарата симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Витамин Е усиливает эффект глюкокортикостероидных препаратов нестероидных противовоспалительных средств увеличивает эффективность и уменьшает токсичность витаминов А D сердечных гликозидов. Повышает эффективность противоэпилептических средств у больных эпилепсией (у которых повышено содержание в крови продуктов перекисного окисления липидов). Несовместим с антибиотиками тетрациклинового ряда. Салицилаты и глюкокортикостероиды уменьшают риск развития побочных эффектов аевита. Слабительные средства в состав которых входит минеральное масло и колестирамин снижают усвоение витаминов А и Е. Пероральные контрацептивы увеличивают концентрацию витамина А в плазме крови. Одновременное применение витамина Е в дозе более 400 ЕД в сутки с антикоагулянтами (производными кумарина и индандиона) повышает риск развития гипопротромбинемии.

Срок хранения после открытия

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре от +5 до +20° С. Хранить в недоступном для детей месте.