Инструкция по применению
Аевит Капсулы 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Витамин Е+Ретинол
Количество в упаковке: 20
Срок годности: 2



Описание

Регулярное поступление витаминов А и Е: • способствует профилактике регрессивных процессов глазных тканей и восстановлению нормального зрения; • улучшает структурно-функциональное состояние кожи и волос; • стимулирует деятельность половой системы и репродуктивных функций; • способствует профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний; • нормализует обмен веществ и работу нервной системы; • повышает защитные силы организма. Содержание в суточной дозе (1 капсула): Витамин Е (DL-альфа-токоферола ацетат)-67,1 мг. Витамин А (Ретинола пальмитат)-2,2 мг. Пищевая ценность на 100 грамм продукта: белки – 20 г, жиры – 67 г, углеводы – 0,2 г. Энергетическая ценность (калорийность) на 100 грамм продукта: 2863 кДж / 684 ккал.

Действующее вещество

Витамин Е+Ретинол

Состав

Льняное масло, DL-альфа-токоферола ацетат (витамин Е), желатин, агент влагоудерживающий – глицерин, вода, ретинола пальмитат (витамин А), антиокислитель «гриндокс 539» (аскорбилпальмитат, концентрат смеси токоферолов, лецитин, рапсовое масло).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуется в качестве БАД к пище, дополнительного источника витаминов А и Е.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле в день во время еды, запивая 1 /2-1 стаканом жидкости. Продолжительность приема – 1 месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью, гипервитаминоз витаминов А и Е.

Побочные действия

Аллергические реакции (кожная сыпь) редко - ощущение дискомфорта в эпигастральной области тошнота диарея. При длительном приеме возможно обострение желчекаменной болезни и хронического панкреатита.

Передозировка

Симптомы острой передозировки (развиваются через 6 часов после приема): гипервитаминоз А: у взрослых - сонливость вялость двоение в глазах головокружение сильная головная боль тошнота неукротимая рвота диарея раздражительность кровоточивость десен сухость и изъязвление слизистой оболочки полости рта шелушение губ кожи (особенно ладоней) спутанность сознания повышение внутричерепного давления (у детей грудного возраста - гидроцефалия выпячивание родничка). Симптомы хронической интоксикации: потеря аппетита боль в костях трещины и сухость кожи сухость слизистой оболочки полости рта губ гастралгия рвота гипертермия астения чрезмерная утомляемость головная боль фоточувствительность поллакиурия никтурия полиурия раздражительность выпадение волос желто-оранжевые пятна на подошвах ладонях в области носогубного треугольника гепатотоксические явления внутриглазная гипертензия олигоменорея портальная гипертензия гемолитическая анемия изменения на рентгенограммах костей судороги. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия. Симптомы передозировки витамина Е: при приеме в течение длительного периода в дозах 400- 800 ЕД в сутки - нечеткость зрительного восприятия головокружение головная боль тошнота диарея гастралгия астения, при приеме более чем 800 ЕД в сутки в течение длительного периода - увеличение риска кровотечений у больных с гиповитаминозом К нарушение метаболизма тиреоидных гормонов расстройства сексуальной функции тромбофлебит некротический колит сепсис гепатомегалия гемморагический инсульт асцит. Лечение: отмена препарата симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Витамин Е усиливает эффект глюкокортикостероидных препаратов нестероидных противовоспалительных средств увеличивает эффективность и уменьшает токсичность витаминов А D сердечных гликозидов. Повышает эффективность противоэпилептических средств у больных эпилепсией (у которых повышено содержание в крови продуктов перекисного окисления липидов). Несовместим с антибиотиками тетрациклинового ряда. Салицилаты и глюкокортикостероиды уменьшают риск развития побочных эффектов аевита. Слабительные средства в состав которых входит минеральное масло и колестирамин снижают усвоение витаминов А и Е. Пероральные контрацептивы увеличивают концентрацию витамина А в плазме крови. Одновременное применение витамина Е в дозе более 400 ЕД в сутки с антикоагулянтами (производными кумарина и индандиона) повышает риск развития гипопротромбинемии.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище. Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25 °C и относительной влажности воздуха не более 70 %.