Инструкция по применению
Аевит Битра капсулы 300 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Битра
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Витамин Е+Ретинол
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 300 мг



Описание

Капсулы Аевит – это витаминный комплексный препарат с иммуностимулирующим и антиоксидантным свойствами.

Действующее вещество

Витамин Е+Ретинол

Состав

Состав: ретинола пальмитат, токоферола ацетат, масло подсолнечное, капсула (желатин, глицерин (Е420), метилпарабен (пара-гидроксибензойной кислоты метилового эфира натриевая соль) (Е219))

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витаминов А и Е.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле в день во время еды.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

Побочные действия

Количественные критерии частоты нежелательных реакций и классификация нежелательных реакций в соответствии с системно-органной классификацией и с частотой их возникновения (Определение частоты побочных явлений проводится в соответствии со следующими критериями: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ от 1/100 до Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: частота неизвестна - кожная сыпь. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: редко - ощущение дискомфорта в эпигастральной области, тошнота, диарея.Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: частота неизвестна - при длительном приеме возможно обострение желчекаменной болезни и хронического панкреатита.

Передозировка

Симптомы острой передозировки (развиваются через 6 часов после приема): гипервитаминоз А: у взрослых - сонливость, вялость, двоение в глазах, головокружение, сильная головная боль, тошнота, неукротимая рвота, диарея, раздражительность, кровоточивость десен, сухость и изъязвление слизистой оболочки полости рта, шелушение губ, кожи (особенно ладоней), спутанность сознания, повышение внутричерепного давления (у детей грудного возраста - гидроцефалия, выпячивание родничка).Симптомы хронической интоксикации: потеря аппетита, боль в костях, трещины и сухость кожи, сухость слизистой оболочки полости рта, губ, гастралгия, рвота, гипертермия, астения, чрезмерная утомляемость, головная боль, фоточувствительность, поллакиурия, никтурия, полиурия, раздражительность, выпадение волос, желто-оранжевые пятна на подошвах, ладонях, в области носогубного треугольника, гепатотоксические явления, внутриглазная гипертензия, олигоменорея, портальная гипертензия, гемолитическая анемия, изменения на рентгенограммах костей, судороги.Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.Симптомы передозировки витамина Е: при приеме в течение длительного периода в дозах 400-800 ЕД в сутки - нечеткость зрительного восприятия, головокружение, головная боль, тошнота, диарея, гастралгия, астения, при приеме более, чем 800 ЕД в сутки в течение длительного периода - увеличение риска кровотечений у больных с гиповитаминозом К, нарушение метаболизма тиреоидных гормонов, расстройства сексуальной функции, тромбофлебит, некротический колит, сепсис, гепатомегалия, гемморагический инсульт, асцит.Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Витамин Е усиливает эффект глюкокортикостероидных препаратов, нестероидных противовоспалительных средств, увеличивает эффективность и уменьшает токсичность витаминов А, D, сердечных гликозидов.Повышает эффективность противоэпилептических средств у больных эпилепсией (у которых повышено содержание в крови продуктов перекисного окисления липидов). Несовместим с антибиотиками тетрациклинового ряда. Салицилаты и глюкокортикостероиды уменьшают риск развития побочных эффектов аевита.Слабительные средства, в состав которых входит минеральное масло и колестирамин снижают усвоение витаминов А и Е.Пероральные контрацептивы увеличивают концентрацию витамина А в плазме крови.Одновременное применение витамина Е в дозе более 400 ЕД в сутки с антикоагулянтами (производными кумарина и индандиона) повышает риск развития гипопротромбинемии.

Особые указания

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.