Инструкция по применению
Афлубин Капли гомеопатические 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Австрия
Производитель: Биттнер Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Горечавка+аконит+бриония двудомная+железа фосфат+молочная кислота
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60

Действующее вещество

Горечавка+аконит+бриония двудомная+железа фосфат+молочная кислота

Состав

В 100 мл препарата содержится: Действующие вещества: горечавка желтая (Gentiana) D1 - 1 мл, аконит аптечный (Aconitum) D6 - 10 мл, бриония двудомная (Bryonia) D6 - 10 мл, железа фосфат (Ferrum phosphoricum) D12 - 10 мл, молочная кислота (Acidum sarcolacticum) D12 - 10 мл, спирт этиловый 43% (по весу) — 59 мл.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Действие препарата Афлубин является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания

Препарат рекомендуется к приему для профилактики и лечения гриппа и прочих острых респираторных заболеваний, а также в комплексном лечении воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся болью в суставах.

Способ применения и дозы

Афлубин применяется за 30 минут до приема пищи или через 60 минут после еды. Для детей возрастом до 1 года используют либо в чистом виде, либо после разведения 1 столовой ложкой воды или грудного молока. Следует перед глотанием препарата задержать на несколько минут жидкость во рту. Детям до 1 года назначают 1 каплю 3-8 раз в день, от года до 12 лет – по 5 капель, с 12 лет и для взрослых – по 10 капель 3-8 рс (при гриппе и острых респираторных инфекциях). Продолжительность курса лечения – 5-10 дней. В качестве плановой превентивной терапии детям до 1 года используют 1 каплю, от года до 12 лет – по 5 капель, с 12 лет и взрослым – 10 капель 2 раза в сутки. Длительность профилактического курса составляет 3 недели. В качестве экстренной превентивной терапии используются те же дозировки, но продолжительность приема препарата – 2 дня. В комплексной терапии ревматических и воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата, сопровождающихся болями в суставах, назначают по 5 капель (детям до 12 лет), 10 капель (с 12 лет и взрослым) 3-8 раз в сутки в первые 1-2 дня, затем используют те же дозировки с кратностью приема не более 3 раз в сутки. Курс лечения – 1 месяц.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Вопрос о применении препарата Афлубин при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Побочные действия

В единичных случаях, у лиц с гиперчувствительностью на любой компонент препарата, возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат не должен применяться пациентами с алкогольной зависимостью.

Особые указания

Из-за наличия в составе капель натуральных растительных компонентов возможно выпадение осадка, который никак не влияет на качество и фармакологические свойства препарата.

Условия хранения

В сухом месте