Инструкция по применению
Афлубин Таблетки гомеопатические 12 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Австрия
Производитель: Биттнер Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Горечавка+аконит+бриония двудомная+железа фосфат+молочная кислота
Количество в упаковке: 12
Срок годности: 36



Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской и риской белого цвета без запаха.

Действующее вещество

Горечавка+аконит+бриония двудомная+железа фосфат+молочная кислота

Состав

Состав (на 1 таблетку): Активные вещества: Gentiana lutea (Gentiana) (Гентиана лютэа (Гентиана)) D1 – 3,6 мг, Aconitum napellus (Aconitum) (Аконитум напеллус (Аконитум)) D6 – 37,2 мг, Bryonia cretica (Brionia) (Бриония кретика (Бриония)) D6 – 37,2 мг, Ferrum phosphoricum (Феррум фосфорикум (Феррум)) D12 – 37,2 мг, Acidum sarcolacticum (Ацидум сарколактикум) D12 – 37,2 мг Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат – 74,6 мг, крахмал картофельный – 20,75 мг, магния стеарат – 2,25 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В комплексном лечении гриппа, парагриппозных и острых респираторных заболеваний с целью облегчения симптомов указанных заболеваний, а также для их профилактики как плановой, так и экстренной. Для лечения воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом.

Способ применения и дозы

Для обеспечения наибольшей эффективности, препарат АФЛУБИН® следует принимать за 30 минут до или через 1 час после приема пищи, таблетку держать под языком до полного рассасывания. Возраст Доза (разовая) Кратность приема и длительность курса Способ применения 1-2 день заболевания ОРЗ или гриппом Взрослые и подростки 1 таблетка От 3 до 8 раз в день (не более) За 30 минут до или через 1 час после еды Дети до 12 лет ½ таблетки От 3 до 8 раз в день (не более) За 30 минут до или через 1 час после еды Дети до 1 года ½ таблетки От 3 до 8 раз в день (не более) Развести в 1 чайной ложке воды или материнского молока, давать по 1 капле за 30 минут до или через 1 час после кормления Дальнейшее лечение клинических проявлений ОРЗ или гриппа Взрослые и подростки 1 таблетка 3 раза в день. 5-10 дней За 30 минут до или через 1 час после еды Дети до 12 лет ½ таблетки 3 раза в день. 5-10 дней За 30 минут до или через 1 час после еды Дети до 1 года ½ таблетки 3 раза в день. 5-10 дней Развести в 1 чайной ложке воды или материнского молока, давать по 1 капле за 30 минут до или через 1 час после кормления Плановая профилактика обострения заболевания в начале холодного времени года или перед эпидемией гриппа Взрослые и подростки 1 таблетка 2 раза в день. 3 недели За 30 минут до или через 1 час после еды Дети до 12 лет ½ таблетки 2 раза в день. 3 недели За 30 минут до или через 1 час после еды Дети до 1 года ½ таблетки 2 раза в день. 3 недели Развести в 1 чайной ложке воды или материнского молока, давать по 1 капле за 30 минут до или через 1 час после кормления Экстренная профилактика – проводится сразу же после контакта с заболевшим гриппом или ОРЗ или после сильного переохлаждения Взрослые и подростки 1 таблетка 2 раза в день. 2 дня За 30 минут до или через 1 час после еды Дети до 12 лет ½ таблетки 2 раза в день. 2 дня За 30 минут до или через 1 час после еды Дети до 1 года ½ таблетки 2 раза в день. 2 дня Развести в 1 чайной ложке воды или материнского молока, давать по 1 капле за 30 минут до или через 1 час после кормления Лечение воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом Взрослые и подростки 1 таблетка 3-8 раз в день в начале лечения (1-2 дня), дальнейшее лечение 3 раза в день в течение 1 месяца За 30 минут до или через 1 час после еды Дети до 12 лет ½ таблетки 3-8 раз в день в начале лечения (1-2 дня), дальнейшее лечение 3 раза в день в течение 1 месяца За 30 минут до или через 1 час после еды

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. До настоящего времени возникновения побочных эффектов не зарегистрировано.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами. Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение).В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. Информация для пациентов с сахарным диабетом: В одной таблетке препарата содержится: 0,24мг углеводов (0,02 хлебной единицы). Энергетическая ценность 1 таблетки (250 мг) 0,94 ккал. В 8 таблетках (максимальная суточная доза) содержится:1,92мг углеводов (0,16 хлебной единицы). Энергетическая ценность 8 таблеток 7,52 ккал. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: Применение препарата не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

В сухом месте