Инструкция по применению
Афлубин Таблетки гомеопатические 48 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Австрия
Производитель: Биттнер Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Горечавка+аконит+бриония двудомная+железа фосфат+молочная кислота
Количество в упаковке: 48
Срок годности: 36.0



Описание

Действие препарата Афлубин является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным. все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Действующее вещество

Горечавка+аконит+бриония двудомная+железа фосфат+молочная кислота

Состав

Активные вещества: горечавка (Gentiana) D1 - 3,6 мг, аконит (Aconitum) D6 - 37,2 мг, бриония (Bryonia) D6 - 37,2 мг, железа фосфат (Ferrum phosphoricum) D12 - 37,2 мг, молочная кислота (Acidum sarcolacticum) D12 - 37,2 мг.Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат. крахмал картофельный. магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Комплексная терапия и профилактика (плановая и экстренная) гриппа, парагриппозных и острых респираторных заболеваний.Лечение воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом.

Способ применения и дозы

При гриппе и ОРЗ (1-2 день заболевания) детям до 1 года Афлубин назначают по 1/2 таб. или 1 кап., детям 1-12 лет - 1/2 таб. или 5 кап., взрослым и подросткам - 1 таб. или 10 кап.. Кратность приема - не более 3-8 раз/сут.При гриппе и ОРЗ (развернутая стадия) детям до 1 года назначают по 1/2 таб. или 1 кап., детям 1-12 лет - 1/2 таб. или 5 кап., взрослым и подросткам - 1 таб. или 10 кап.. Кратность приема - 3 раза/сут в течение 5-10 дней.Для плановой профилактики гриппа в начале холодного времени года или за 1 мес до ежегодно ожидаемого пика заболеваемости детям до 1 года назначают по 1/2 таб. или 1 кап., детям 1-12 лет - 1/2 таб. или 5 кап., взрослым и подросткам - 1 таб. или 10 кап.. Кратность приема - 2 раза/сут. Продолжительность курса - 3 недели.Для экстренной профилактики гриппа и ОРЗ сразу же после контакта с заболевшим или после сильного переохлаждения детям до 1 года Афлубин назначают по 1/2 таб. или 1 кап., детям 1-12 лет - 1/2 таб. или 5 кап., взрослым и подросткам - 1 таб. или 10 кап.. Кратность приема - 2 раза/сут. Продолжительность курса - 2 дня.Для лечения воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом, детям 1-12 лет - 1/2 таб. или 5 кап., взрослым и подросткам - 1 таб. или 10 кап. Кратность приема - 3-8 раз/сут в начале лечения (1-2 день), в дальнейшем - 3 раза/сут в течение 1 мес.В начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата Афлубин каждые 0.5-1 ч по 8-10 кап., но не более 8 раз /сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут.Препарат Афлубин принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи. Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 стол. л. воды. Детям до 1 года капли разводят в 1 чайн. л. воды или материнского молока. 1/2 таб. также следует растворить в 1 чайн. л. воды или материнского молока и давать по 1 кап. Перед проглатыванием рекомендуется задержать препарат во рту на некоторое время. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

Противопоказания

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Применение при беременности и кормлении грудью

по назначению врача

Побочные действия

Редко: повышенное слюноотделение. Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимое взаимодействие с другими ЛС не установлено.

Особые указания

Поскольку препарат Афлубин в форме капель гомеопатических содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Условия хранения

В сухом месте