Инструкция по применению
Агри детский (Антигриппин гомеопатический для детей) Таблетки гомеопатические 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: МАТЕРИА МЕДИКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 40



Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы, с фаской, белого или почти белого цвета.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Контурная ячейковая упаковка №1 Активные компоненты: Aconitum napellus, Aconitum (Аконитум напеллюс (Аконитум)) С30, Arsenum iodatum (Арсенум иодатум) С30, Atropa belladonna (Атропа белладонна) С30, Ferrum phosphoricum (Феррум фосфорикум) С30. Вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат. Контурная ячейковая упаковка №2 Активные компоненты: Bryonia dioica (Бриония диоика) С30, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla (Пульсатилла пратензис (Пульсатилла)) С30, Hepar sulfuris, Hepar sulfuris calcareum (Гепар сульфурис (Гепар сульфурис калькареум)) С30. Вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве симптоматического средства в терапии острых респираторных заболеваний, а также для профилактики гриппа и ОРВИ у детей старше 1 года.

Способ применения и дозы

Внутрь. По 1 таблетке на прием, не менее чем за 15 минут до еды (таблетку следует держать во рту до полного растворения). Прием препарата с лечебной целью целесообразно начинать при появлении первых признаков заболевания. Препарат назначают детям старше 1 года в одинаковой дозе независимо от возраста по следующей схеме: в остром периоде заболевания (первые два дня) препарат принимают по 1 таблетке каждые 30 минут, чередуя контурные ячейковые упаковки №1 и №2, исключая перерыв на сон. В этот период заболевания препарат можно принимать без учёта времени приёма пищи. В последующие дни (с 3-го дня приема и до полного выздоровления) препарат принимают каждые 2 часа (исключая перерыв на сон), чередуя контурные ячейковые упаковки №1 и №2. По мере улучшения состояния возможен более редкий прием препарата (2-3 раза в сутки). Детям младшего возраста рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) кипяченой воды комнатной температуры. С профилактической целью препарат применяют в период эпидемии гриппа и ОРВИ по 1 таблетке утром натощак (ежедневно чередуя контурные ячейковые упаковки №1 и №2).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания, так как эффективность и безопасность в этот период не изучались.

Побочные действия

При использовании препарата по указанным показаниям и в указанных дозировках побочного действия до настоящего времени не выявлено. Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Передозировка

При случайной передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав препарата вспомогательными веществами.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрировано.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Отрицательного влияния препарата Агри детский на способность управления транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами не выявлено.

Условия хранения

При температуре не выше 25гр.С. Хранить в недоступном для детей месте. В течение периода применения препарата хранить контурную ячейковую упаковку в картонной пачке, предусмотренной производителем.