Инструкция по применению
Акогриппин - Мега фарм Таблетки 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Мега Фарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1



Описание

Таблетки круглые, плоскоцилиндрические белого, белого с сероватым или белого с желтоватым оттенком цвета, с риской и фаской.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Таблетки - 1 таб.: активные компоненты: aconitum napellus (aconitum) D3, D12 0,033 г, atropa bella-donna (belladonna) D6 0,033 г, bryonia D3 0,033 г, bryonia D12 0,033 г, lachesis mutus (lachesis), D12 0,033 г, eupatorium perfoliatum D3 0,033 г, toxicodendron quercifolium; (rhus toxicodendron) D30 0,033 г, phosphorus, D6 0,033 г; вспомогательные вещества: лактоза 0,282 г, крахмал картофельный 0,015 г, кальция стеарат 0,003, г. Таблетки подъязычные гомеопатические.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Для лечения и сезонной профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (в комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Для лечения: Рассасывать под языком за 30 минут до или через 1 час после еды. Дети с 3 до 7 лет: по 1/2 таблетки через каждые 2 часа (но не более 8 раз в день) в течение 1-2 дней, далее по 1/2 т таблетки 3 раза в день. Дети с 7 до 12 лет: по 1 таблетке через каждые 2 часа (но не более 8 раз в день) в течение 1-2 дней, далее по 1 таблетке 3 раза в день. Старше 12 лет и взрослые: по 1 таблетке через каждый час (но не более 12 раз в день) в течение 1-2 дней, далее по 1 -2 таблетке 3 раза в день. Для профилактики: Дети с 3 до 12 лет: по 1 таблетке в день, дети старше 12 лет и взрослые - по 1 таблетке 2 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды под язык в период эпидемии.

Противопоказания

Туберкулез легких. Детский возраст до 3-х лет. Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

До настоящего времени информация о случаях побочных эффектов не поступала. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических препаратов может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта в течение первых двух дней, а также появлении побочных эффектов, следует обратиться к врачу. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами и т.п.).

Условия хранения

При комнатной температуре