Инструкция по применению
Multi-Gyn Actigel Гель вагинальный 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Нидерланды
Производитель: Фарм-Синтез
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Описание

Актигель Мульти-гин основан на патентованном комплексе 2QR. Данное натуральное вещество добывают из лекарственных растений. Оно состоит из биоактивных полисахаридов. Оно обладает уникальной способностью блокировать механизм адгезии вредных бактерий и, таким образом, нейтрализует действие этих бактерий. Этот блокирующий эффект абсолютно безопасен и безвреден, т.к. он не обусловлен токсическими веществами или агрессивными химикатами. Поэтому комплекс не обладает отрицательными побочными свойствами. Помимо основного свойства, позволяющего блокировать вредные бактерии, гель Мульти-Гин АктиГель укрепляет естественную восстановительную способность тканей и улучшает состояние слизистой оболочки. Он быстро восстанавливает оптимальную кислотность влагалища (показатель pH). Мульти-Гель АктиГель способствует росту численности полезных лактобактерий (молочнокислых бактерий), в результате чего создает оптимальную и естественную микрофлору, препятствующую появлению дискомфорта.

Состав

Сетчатый сополимер галактоарабинана и полиглюкороновой кислоты (комплекс 2QR: запатентованный комплекс биоактивных полисахаридов), ксантановая смола, глицерин, каприлилгликоль - pH 4,1.

Форма выпуска

Гель

Показания

Используется при бактериальном вагинозе (БВ). Уменьшает неприятный запах и выделения, оказывает успокаивающее действие при зуде и раздражении, способствует предотвращению вагинального дискомфорта. Вы можете использовать гель Мульти-Гин АктиГель сколь угодно часто, каждый раз, когда Вы испытываете или желаете предотвратить такие виды дискомфорта, как зуд, повышенную чувствительность или раздражение. При Бактериальном Вагинозе, сопровождающимся нежелательными выделениями и/или запахом, вводите гель во влагалище не менее двух раз в сутки в течение 5 дней. Для профилактики нежелательных выделений, запаха и, связанных с ними жалоб, гель достаточно применять один раз каждые три дня. При более частом применении средства эффективность возрастает. Гель рекомендуется наносить перед сном. При незащищенном половом акте кислотность (pH) влагалища нарушается. Используйте гель Мульти-Гин АктиГель в течение 8 часов после полового акта для восстановления оптимального pH влагалища и профилактики появления неприятного запаха. В случае вагинального дискомфорта, который может проявляться как зуд, раздражение, чувствительность, краснота и болезненность, обильно наносите гель Мульти-Гин АктиГель не реже одного раза в день и каждый раз, когда необходимо устранить дискомфорт. После нанесения геля у Вас может возникнуть легкое пощипывание. Это нормально, и эти ощущения быстро исчезнут. Мульти-Гин АктиГель полностью безопасен и может применяться без ограничений. Он может использоваться в сочетании с любыми лекарственными средствами. В случае длительных или повторяющихся жалоб необходимо обратиться к врачу. Курс применения геля Мульти-Гин АктиГель не должен превышать 30 дней, чтобы вагинальная микрофлора могла саморегулироваться без поддержки препаратов. При дискомфорте наружных половых органов (вульвы) Вы можете наносить гель Мульти-Гин АктиГель пальцем (перед нанесением следует обязательно вымыть руки). Для введения внутрь Вы можете использовать специальный аппликатор. Он прилагается в комплекте и навинчивается на тюбик. С помощью аппликатора Вы можете ввести гель во влагалище. После использования Вы можете оставить аппликатор на тюбике, промыв его теплой водой и затем надеть на него колпачок. Средство также можно вводить внутрь пальцем. Для этого вымойте руки и нанесите гель на указательный палец в количестве, которое должно быть по размеру не меньше кончика указательного пальца. Введите палец во влагалище.

Способ применения и дозы

Вы можете использовать гель Мульти-Гин АктиГель сколь угодно часто, каждый раз, когда Вы испытываете или желаете предотвратить такие виды дискомфорта, как зуд, повышенную чувствительность или раздражение. При Бактериальном Вагинозе, сопровождающимся нежелательными выделениями и/или запахом, вводите гель во влагалище не менее двух раз в сутки в течение 5 дней. Для профилактики нежелательных выделений, запаха и, связанных с ними жалоб, гель достаточно применять один раз каждые три дня. При более частом применении средства эффективность возрастает. Гель рекомендуется наносить перед сном. При незащищенном половом акте кислотность (pH) влагалища нарушается. Используйте гель Мульти-Гин АктиГель в течение 8 часов после полового акта для восстановления оптимального pH влагалища и профилактики появления неприятного запаха. В случае вагинального дискомфорта, который может проявляться как зуд, раздражение, чувствительность, краснота и болезненность, обильно наносите гель Мульти-Гин АктиГель не реже одного раза в день и каждый раз, когда необходимо устранить дискомфорт. После нанесения геля у Вас может возникнуть легкое пощипывание. Это нормально, и эти ощущения быстро исчезнут. Мульти-Гин АктиГель полностью безопасен и может применяться без ограничений. Он может использоваться в сочетании с любыми лекарственными средствами. В случае длительных или повторяющихся жалоб необходимо обратиться к врачу. Курс применения геля Мульти-Гин АктиГель не должен превышать 30 дней, чтобы вагинальная микрофлора могла саморегулироваться без поддержки препаратов. При дискомфорте наружных половых органов (вульвы) Вы можете наносить гель Мульти-Гин АктиГель пальцем (перед нанесением следует обязательно вымыть руки). Для введения внутрь Вы можете использовать специальный аппликатор. Он прилагается в комплекте и навинчивается на тюбик. С помощью аппликатора Вы можете ввести гель во влагалище. После использования Вы можете оставить аппликатор на тюбике, промыв его теплой водой и затем надеть на него колпачок. Средство также можно вводить внутрь пальцем. Для этого вымойте руки и нанесите гель на указательный палец в количестве, которое должно быть по размеру не меньше кончика указательного пальца. Введите палец во влагалище.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Только для наружного применения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Гель Мульти-Гин АктиГель безопасен при применении в период беременности и грудного вскармливания.

Побочные действия

Поскольку pH геля Мульти-Гин соответствует оптимальной кислотности влагалища, а сперма имеет щелочную реакцию, применение геля Мульти-Гин АктиГель может приводить к снижению активности спермы. Поэтому, если Вы хотите забеременеть, гель Мульти-Гин АктиГель не следует использовать перед или в первые часы после полового акта. Другие побочные эффекты неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

Не взаимодействует с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Случаи развития аллергических реакций на гель Мульти-Гин АктиГель очень редки. Если у Вас возникли сомнения, то нанесите небольшое количество геля на внутреннюю часть предплечья. Если в результате этого у Вас появится зудящее покраснение, то применение геля Мульти-Гин АктиГель не рекомендуется. Гель Мульти-Гин АктиГель не содержит отдушек, ингредиентов животного происхождения, агрессивных химикатов, консервантов или гормонов, и его применение абсолютно безопасно. Не нарушает целостности презерватива.

Условия хранения

В сухом месте