
Инструкция по применению
Актитенз Таблетки 5 мг + 40 мг 30 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Симпекс Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Амлодипин+Телмисартан
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 5 мг + 40 мг

Описание

АКТИТЕНЗ®, 5 мг + 40 мг, таблетки Овальной формы, двояковыпуклые, двухслойные таблетки, без оболочки, один слой от белого до почти белого цвета, другой слой голубовато-серого цвета с возможными вкраплениями более светлого и более темного цвета, гладкие с обеих сторон.

Действующее вещество

Амлодипин+Телмисартан

Состав

Действующими веществами являются: амлодипин и телмисартан. АКТИТЕНЗ®, 5 мг + 40 мг, таблетки Каждая таблетка содержит 5 мг амлодипина и 40 мг телмисартана. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: маннитол SD-200, натрия гидроксид, меглюмин, повидон K-30, магния стеарат, натрия стеарил фумарат, микрокристаллическая целлюлоза PH102, крахмал прежелатинизированный, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный, смесь красителей: краситель железа оксид черный (E172), краситель железа оксид желтый (E172), краситель синий FD & C (E133). См. раздел 2 листка-вкладыша, подраздел Препарат АКТИТЕНЗ® содержит натрий.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат АКТИТЕНЗ® показан к применению у взрослых старше 18 лет: - Для лечения артериальной гипертензии (для пациентов, артериальное давление которых недостаточно контролируется амлодипином или телмисартаном в монотерапии). - Для лечения артериальной гипертензии (для пациентов, которым показана комбинированная терапия). - Для пациентов с артериальной гипертензией, получающих амлодипин и телмисартан в виде отдельных таблеток, в качестве замены данной терапии. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза Рекомендуемая доза препарата составляет 1 таблетку один раз в сутки. Старайтесь принимать таблетку каждый день в одно и то же время. Обычная начальная доза препарата АКТИТЕНЗ® составляет 5 мг + 40 мг один раз в сутки. Пациентам, которым необходимо более значимое снижение артериального давления, врач может назначить начальную дозу препарата 5 мг + 80 мг один раз в сутки. Если, по крайней мере, через 2 недели лечения потребуется дополнительное снижение артериального давления, врач может постепенно увеличить дозу до максимальной: 10 мг + 80 мг один раз в сутки. Доза препарата подбирается индивидуально и корректируется Вашим лечащим врачом. Ваш врач может назначить дополнительно другие препараты, которые применяются для лечения высокого артериального давления. Важно продолжать принимать препарат АКТИТЕНЗ®, пока Ваш лечащий врач не даст Вам иные рекомендации. Путь и (или) способ введения Внутрь. Таблетки следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством жидкости, вне зависимости от приема пищи. Продолжительность лечения Важно принимать препарат АКТИТЕНЗ® каждый день, пока лечащий врач не отменит лечение препаратом.

Противопоказания

Не принимайте препарат АКТИТЕНЗ®, если: - у Вас аллергия на телмисартан, амлодипин, другие производные дигидропиридина или на любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), - Вы беременны (см. раздел 2 листка-вкладыша, подраздел Беременность и грудное вскармливание), - Вы кормите грудью (см. раздел 2 листка-вкладыша, подраздел Беременность и грудное вскармливание), - у Вас нарушение оттока желчи из печени и желчного пузыря (обструктивные заболевания желчевыводящих путей), - у Вас тяжелое нарушение функции печени, - у Вас выраженное снижение артериального давления (тяжелая артериальная гипотензия), - у Вас нарушено поступление крови из левого желудочка в аорту, например, из-за выраженного сужения аортального клапана сердца (высокой степени аортального стеноза), - у Вас сердечная недостаточность с выраженным нарушением параметров кровообращения (гемодинамически нестабильная) после перенесенного острого инфаркта миокарда, - Ваше сердце не может снабжать организм достаточным количеством крови (у Вас кардиогенный шок), - у Вас сахарный диабет или нарушение функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73 м^2 площади поверхности тела), и Вы принимаете препараты для снижения артериального давления, содержащие алискирен, - у Вас поражение почек на фоне сахарного диабета (диабетическая нефропатия), и Вы принимаете препараты для снижения артериального давления и лечения сердечной недостаточности, называемые ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). Если любое из перечисленных утверждений относится к Вам, обязательно сообщите об этом врачу до начала приема препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Прием препарата АКТИТЕНЗ® противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания. Беременность Не принимайте препарат АКТИТЕНЗ® во время беременности. Необходимо проинформировать врача, если Вы считаете, что можете быть беременны (или можете забеременеть в ближайшее время). Ваш лечащий врач порекомендует Вам прекратить прием препарата АКТИТЕНЗ® до наступления беременности или сразу же после подтверждения беременности. При необходимости продолжить лечение Ваш лечащий врач заменит препарат АКТИТЕНЗ® другим препаратом. При планировании беременности необходимо прекратить прием препарата и обратиться к лечащему врачу, препарат должен быть заменен на другой препарат, разрешенный к применению при беременности. Грудное вскармливание Не принимайте препарат АКТИТЕНЗ® в период грудного вскармливания. При необходимости применения препарата АКТИТЕНЗ® в период лактации прекратите грудное вскармливание. Ваш лечащий врач может порекомендовать другое лечение, если Вы хотите продолжить кормить грудью. Нет данных

Побочные действия

Нежелательные реакции при приёме препарата АКТИТЕНЗ® (амлодипин + телмисартан) Срочно обратитесь к врачу (прекратите приём и вызовите скорую) при: Частые реакции (до 1 из 10 человек): Нечастые реакции (до 1 из 100 человек): Дополнительные реакции для амлодипина: лабильность настроения, нарушение зрения, шум в ушах, ринит, гипергидроз, алопеция, петехии/пурпура, изменение цвета кожи, нарушение мочеиспускания, поллакиурия, гинекомастия, изменение массы тела. Дополнительные реакции для телмисартана: инфекции мочевыводящих и верхних дыхательных путей, анемия, гиперкалиемия, метеоризм, нарушение функции почек, повышение креатинина. Редкие реакции (до 1 из 1 000 человек): Дополнительные реакции для амлодипина: спутанность сознания, недомогание. Дополнительные реакции для телмисартана: тромбоцитопения, эозинофилия, гипогликемия (у диабетиков), нарушение зрения, тахикардия, дискомфорт в желудке, поражение печени, сыпь, боль в сухожилиях, гриппоподобное состояние, снижение гемоглобина, повышение КФК. Очень редкие реакции (до 1 из 10 000 человек): Важно:

Передозировка

Если Вы приняли препарата АКТИТЕНЗ® больше, чем следовало Если Вы приняли препарата АКТИТЕНЗ® больше, чем следовало, немедленно обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или в ближайшее медицинское учреждение. Прием слишком большого количества таблеток препарата может привести к снижению артериального давления или даже опасно низкому снижению артериального давления. Вы можете почувствовать головокружение, ощущение тумана в голове, слабость или потерять сознание. При выраженном снижении артериального давления может развиться шок. При этом Ваша кожа может стать холодной и влажной на ощупь, и Вы можете потерять сознание. Если Вы забыли принять препарат АКТИТЕНЗ® Если Вы забыли принять очередную дозу препарата, не беспокойтесь. Примите ее сразу же, как только обнаружили это, и затем продолжайте прием как обычно. Если время приема следующей дозы почти наступило, просто примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку. Если Вы прекратили прием препарата АКТИТЕНЗ® Не прекращайте применение препарата без консультации с врачом. Ваше состояние может ухудшиться, если Вы прекратите прием препарата самостоятельно без консультации с врачом. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к Вашему лечащему врачу или работнику аптеки.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие препарата АКТИТЕНЗ® с другими средствами Обязательно сообщите врачу или фармацевту обо всех принимаемых/планируемых к приёму препаратах — может потребоваться коррекция доз или отмена одного из средств. Питание и алкоголь: При необходимости коррекции дозы проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Особые указания

Противопоказания, ограничения и особенности применения препарата АКТИТЕНЗ® 1. Основные противопоказания: 2. Особые группы пациентов: 3. Важные взаимодействия: 4. Ключевые риски: 5. Прочие замечания:

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить при температуре не выше 25 °C.