Инструкция по применению
Актитропил Таблетки 100 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фонтурацетам
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 100 мг



Описание

плоскоцилиндрические таблетки от белого до белого с желтоватым или коричневатым оттенком цвета с риской с одной стороны и фаской, допускается мраморность.

Действующее вещество

Фонтурацетам

Состав

Действующее вещество: Фонтурацетам - 118,0 мг. Вспомогательные вещества: Целлюлоза микрокристаллическая 101 - 18,0 мг Повидон К-17 (поливинилпирролидон низкомолекулярный К-17) - 40,0 мг Гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 20,0 мг Натрия гидрокарбонат - 20,0 мг Стеариновая кислота - 2,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание Быстро всасывается, проникает в различные органы и ткани, легко проходит через гематоэнцефалический барьер. Распределение Абсолютная биодоступность при пероральном приеме составляет 100 %. Максимальная концентрация в крови (Tmax) достигается через 1 ч, период полувыведения (T1/2) - 3 - 5 ч. Метаболизм Не метаболизируется в организме. Выведение Выводится в неизмененном виде: примерно 40 % - с мочой и 60 % - с желчью и потом.

Показания

* Заболевания ЦНС различного генеза, особенно связанные с сосудистыми заболеваниями и нарушениями обменных процессов в мозге, интоксикацией (в частности, при посттравматических состояниях и явлениях хронической цереброваскулярной недостаточности), сопровождающиеся ухудшением интеллектуально-мнестических функций, снижением двигательной активности * Невротические состояния, проявляющиеся вялостью, повышенной истощаемостью, снижением психомоторной активности, нарушением внимания, ухудшением памяти * Нарушения процесса обучения * Ожирение (алиментарно-конституционального генеза) * Профилактика гипоксии, повышение устойчивости к стрессу, коррекция функционального состояния организма в экстремальных условиях профессиональной деятельности с целью предупреждения развития утомления и для повышения умственной и физической работоспособности * Хронический алкоголизм (с целью уменьшения явлений астении, интеллектуально-мнестических нарушений)."

Способ применения и дозы

Внутрь. Принимать сразу после еды. Доза и продолжительность лечения должны определяться врачом. Дозы варьируют в зависимости от особенностей состояния пациента. Средняя разовая доза составляет 150 мг (от 100 до 250 мг) средняя суточная доза - 250 мг (от 200 до 300 мг). Максимальная допустимая доза - 750 мг/сут. Рекомендуется суточную дозу до 100 мг принимать однократно в утренние часы, а свыше 100 мг разделять на 2 приема. Продолжительность лечения может варьировать от 2 недель до 3 мес., в среднем 30 дней. При необходимости курс может быть повторен через 1 месяц. Для повышения работоспособности - 100 - 200 мг однократно в утренние часы, в течение 2 недель (для спортсменов - 3 дня). Рекомендуемая длительность лечения для больных с алиментарно-конституциональным ожирением составляет 30 - 60 дней в дозе 100 - 200 мг один раз в день (в утренние часы). Не рекомендуется принимать препарат позднее 15 ч.

Противопоказания

* Гиперчувствительность к действующему веществу и/или к любому вспомогательному веществу препарата * Беременность * Период грудного вскармливания * Детский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность препарата не установлены)

Применение при беременности и кормлении грудью

Не следует назначать при беременности и в период грудного вскармливания из-за отсутствия данных клинических исследований.

Побочные действия

Бессонница (в случае приема препарата позднее 15 ч). У некоторых больных в первые 1 - 3 дня приема возможны психомоторное возбуждение, гиперемия кожных покровов, ощущение тепла, повышение артериального давления.

Передозировка

Случаев передозировки не отмечалось. Лечение: симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Фонтурацетам может усиливать действие препаратов, стимулирующих ЦНС, антидепрессантов и ноотропных препаратов. Препарат проявляет выраженный антагонизм каталептическому действию нейролептиков, а также ослабляет выраженность снотворного действия этанола и гексобарбитала.

Особые указания

При чрезмерном психоэмоциональном истощении на фоне хронического стресса и утомления, хронической бессонницы, однократный прием препарата в первые сутки может вызвать резкую потребность во сне. Таким пациентам в амбулаторных условиях следует рекомендовать начинать курсовой прием препарата в нерабочие дни.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.