Инструкция по применению
Альбумин раствор для инфузий 10% 200мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: МИКРОГЕН
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Альбумин человека
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 100 мг/1 мл

Действующее вещество

Альбумин человека

Состав

Раствор для инфузий 10% 1 мл 1 фл. альбумин человека 100 мг 20 г. Вспомогательные вещества: магния стеарат, поливидон, натрия крахмала гликолат, целлюлоза микрокристаллическая. Состав пленочной оболочки: титана диоксид, тальк, гипромеллоза.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Средство, получаемое путем фракционирования крови, плазмы, плаценты, сыворотки от здоровых доноров. Поддерживает коллоидно-осмотическое (онкотическое) давление крови, увеличивает ОЦК, повышает АД. Способствует проникновению тканевой жидкости в кровяное русло. Является источником белка.

Способ применения и дозы

Травматический и послеоперационный шок, ожоги, сопровождающиеся дегидратацией и концентрацией крови, гипопротеинемия и гипоальбуминемия, развивающиеся при нутритивной дистрофии, нефротических синдромах, гломерулонефритах, циррозе печени, длительных гнойных процессах, поражение ЖКТ с нарушением питания больного (в т.ч. язвенная болезнь, опухоли).

Противопоказания

Индивидуальный, в зависимости от показаний и клинической ситуации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Пациентам с дегидратацией перед введением альбумина человеческого следует обеспечить достаточное поступление жидкости в организм. С осторожностью применяют у пациентов со сниженным сердечным резервом из-за повышенного риска развития острой сердечной недостаточности. При применении препаратов из крови и плазмы человека нельзя полностью исключить вероятность заражения инфекционными заболеваниями.

Побочные действия

При одновременном применении альбумина человеческого с ингибиторами АПФ повышается риск развития артериальной гипотензии.

Особые указания

При одновременном применении альбумина человеческого с ингибиторами АПФ повышается риск развития артериальной гипотензии.