Инструкция по применению
Альбумин раствор для инфузий 5% 100мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Беларусь
Производитель: Октафарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Альбумин человека
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 50 мг/1 мл

Описание

Плазмозамещающее средство

Действующее вещество

Альбумин человека

Состав

альбумин человека

Форма выпуска

Раствор

Показания

Травматический и послеоперационный шок, ожоги, сопровождающиеся дегидратацией и концентрацией крови, гипопротеинемия и гипоальбуминемия, развивающиеся при нутритивной дистрофии, нефротических синдромах, гломерулонефритах, циррозе печени, длительных гнойных процессах, поражение ЖКТ с нарушением питания больного (в т.ч. язвенная болезнь, опухоли).

Способ применения и дозы

Индивидуальный, в зависимости от показаний и клинической ситуации.

Противопоказания

Тромбоз, артериальная гипертензия, продолжающееся внутреннее кровотечение, тяжелая анемия, тяжелые формы сердечной недостаточности, повышенная чувствительность к альбумину человеческому.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности применение альбумина человеческого возможно только в случаях крайней необходимости. Данные о безопасности применения альбумина человеческого в период лактации отсутствуют.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: возможны тошнота, рвота, гиперсаливация. Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, тахикардия. Аллергические реакции: возможна крапивница, редко - анафилактический шок. Прочие: возможны повышение температуры тела, боли в поясничной области.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении альбумина человеческого с ингибиторами АПФ повышается риск развития артериальной гипотензии.

Особые указания

Пациентам с дегидратацией перед введением альбумина человеческого следует обеспечить достаточное поступление жидкости в организм. С осторожностью применяют у пациентов со сниженным сердечным резервом из-за повышенного риска развития острой сердечной недостаточности. При применении препаратов из крови и плазмы человека нельзя полностью исключить вероятность заражения инфекционными заболеваниями.