Инструкция по применению
Алевал таблетки покрытые пленочной оболочкой 100мг N14

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Сан Фармасьютикал
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Сертралин
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 100 мг

Описание

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Алевал голубого цвета, круглые, двояковыпуклые, с риской с одной стороны, на изломе - ядро белого цвета.

Действующее вещество

Сертралин

Состав

1 таблетка содержит: сертралина гидрохлорид 28 мг, что соответствует содержанию сертралина 25 мг. Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфата дигидрат, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, гипромеллоза 2910, тальк очищенный, стеарат магния, диоксид кремния коллоидный безводный, кросповидон, индигокармин. Состав пленочной оболочки: гипромеллоза 2910, макрогол 6000, тальк очищенный, диоксид титана, индигокармин.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме внутрь всасывание сертралина из ЖКТ значительное, но происходит медленно. Cmax в плазме крови достигается через 4,5-8,4 ч после приема препарата внутрь. Css сертралина в плазме крови достигается в пределах недели при однократном ежедневном приеме. При приеме препарата во время приема пищи биодоступность повышается на 25%, при этом время достижения Cmax уменьшается.

Показания

Депрессии различной этиологии (лечение и профилактика), обсессивно-компульсивные расстройства (ОКР), панические расстройства (с агорафобией или без), посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР).

Способ применения и дозы

Препарат назначают внутрь, 1 раз/сут утром или вечером. Таблетки сертралина можно принимать независимо от приема пищи.

Противопоказания

Гиперчувствительность, одновременное применение ингибиторов МАО, триптофана или фенфлурамина, нестабильная эпилепсия, детский возраст до 6 лет

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Категория действия на плод по FDA — C. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание (сертралин обнаруживается в грудном молоке).

Побочные действия

Со стороны нервной системы и органов чувств: сонливость, головокружение, головная боль, инсомния, спутанность сознания, амнезия, атаксия, дискоординация, гипер- и парестезии, гиперкинезы, гипо- и дискинезия, экстрапирамидные расстройства, судороги, мидриаз, нистагм, птоз, гипорефлексия, агрессивность, тревожность, психоз, амнезия, апатия, деперсонализация, эмоциональная лабильность, эйфория, галлюцинации, параноидальные реакции, сомнамбулизм. Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): артериальная гипертензия или артериальная гипотензия, сердцебиение, боль в груди, анемия, редко — тахикардия, коллаптоидные состояния. Со стороны органов ЖКТ: сухость во рту, снижение аппетита вплоть до анорексии (редко — повышение аппетита, возможно как следствие устранения депрессии), диспептические расстройства (метеоризм, тошнота, рвота, диарея или неустойчивый стул, запор), спазмы в желудке, боль в животе, панкреатит, изменение печеночных тестов, гепатит, желтуха или печеночная недостаточность, дисфагия, раздражение слизистой оболочки ЖКТ, глоссит, гипертрофия десен, язвенный стоматит. Со стороны респираторной системы: ощущение сдавления грудной клетки. Со стороны мочеполовой системы: задержка эякуляции, снижение либидо, эректильная дисфункция, аноргазмия, нарушения менструального цикла, гинекомастия, приапизм, дизурия, гиперпролактинемия, галакторея. Аллергические реакции: покраснение кожи, крапивница, отечность лица или губ, кожная сыпь, генерализованный зуд, многоформная экссудативная эритема. Прочие: отеки (в т.ч. периорбитальные), артралгия, лимфоаденопатия, повышенное потоотделение, снижение массы тела, синдром отмены.