# Инструкция по применению
# Альгавак М суспензия для инъекций 1 мл № 10

## Характеристики




Форма выпуска: Суспензия
Страна: Россия
Производитель: Вектор
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Вакцина гепатита А культуральная очищенная концентрированная адсорбированная инактивированная жидкая
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 160 ИФА ЕД/1 доза

## Описание

Вакцина для профилактики вирусного гепатита А

## Действующее вещество

Вакцина гепатита А культуральная очищенная концентрированная адсорбированная инактивированная жидкая

## Состав

Вакцина для профилактики гепатита А (инактивированный антиген вируса гепатита А) 50 ИФА единиц. Вспомогательные вещества: алюминия гидроксид 0.5 мг, формальдегид не более 0.15 мг, фосфатно-солевой буферный раствор 0.01 М до 1 мл.

## Форма выпуска

Суспензия

**Показания**

Активная профилакгика вирусного гепатита А у детей в возрасте от 3 лет, подростков и взрослых.Вакцинации подлежат лица, которые подвергаются или будут подвергаться риску заражения вирусным гепатитом А:лица, проживающие на территориях с высоким уровнем заболеваемости гепатитом А,лица, выезжающие в регионы с высоким уровнем заболеваемости гепатитом А (военнослужащие, путешественники и др.),лица, контактные в очагах,лица, подверженные профессиональному риску заражения: медицинский персонал и персонал по уходу за больными (в особенности в инфекционных, гастроэнтерологических и педиатрических отделениях), персонал детских дошкольных учреждений, аботники канализационных и водопроводных служб, персонал пищевой промышленности и предприятий общественного питания,лица из числа особых групп риска (пациенты, с хроническими заболеваниями печени или повышенным риском заболевания печени, больные гемофилией, пациенты с множественными гемотрансфузиями, наркоманы, гомосексуалисты, лица, ведущие беспорядочную половую жизнь).

**Способ применения и дозы**

Вакцину вводят внутримышечно в дельтовидную мышцу (мышца плеча).Одна прививочная доза составляет: для детей и подростков- 0,5 мл, для взрослых -1,0 мл. Курс вакцинации, обеспечивающий длительную защиту от заболевания гепатитом А, состоит из двух прививок, проводимых с интервалом 6-12 мес. Однократное введение вакцины обеспечивает защиту от инфекции сроком до 12 мес.

**Противопоказания**

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний. Прививку проводят не ранее, чем через 1 месяц после выздоровления (ремиссии),сильная реакция (температура выше 40°С, гиперемия, отек в месте введения диаметром более 8 см) при предыдущем введении препарата, иммунодефицитные состояния, злокачественные заболевания крови и новообразования,беременность,гиперчувствительность к любому компоненту вакцины. С целью выявления противопоказаний врач (фельдшер) в день прививки проводит осмотр и опрос прививаемого с обязательной термометрией. В случае необходимости проводят соответствующее лабораторное обследование.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Противопоказано при беременности.

**Побочные действия**

В единичных случаях у привитых лиц может наблюдаться недомогание, головная боль, кратковременная субфебрильная температура. В редких случаях наблюдаются быстропроходящая незначительная болезненность или подергивание мышц в месте введения вакцины, а также незначительная гиперемия кожи или слабо выраженный отек, которые проходят через 1 -2 суток.Учитывая теоретическую возможность развития аллергических реакций немедленного типа у особо чувствительных лиц, за привитыми необходимо обеспечить медицинское наблюдение в течение 30 мин. Места проведения прививок должны быть обеспечены средствами противошоковой терапии.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Допускается одновременное (в один день) применение «Альгвак М» с другими инактивированными вакцинами национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (за исключением антирабической вакцины) при условии введения вакцин в разные участки тела.