Инструкция по применению
Аллапинин Таблетки 25мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вилар
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Лаппаконитина гидробромид
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 25 мг

Действующее вещество

Лаппаконитина гидробромид

Состав

Лаппаконитина гидробромид (аллапинин) 25 мгвспомогательные вещества: сахар (сахароза), или сахар-рафирад, или сахар-песок 65.5 мг, крахмал картофельный 7.5 мг, кальция стеарат (кальций стеариновокислый) 1 мг, кроскармеллоза натрия 1 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

ВсасываниеБиодоступность составляет 40%. Препарат подвергается эффекту первого прохождения через печень. Распределение и метаболизмПри приеме внутрь V d составляет 690 л. Проникает через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). ВыведениеТ 1 /2 составляет 1-1.2 ч. Выводится почками. Фармакокинетика в особых клинических случаяхПри длительном применении возможно увеличение Т 1/2 . При хронической почечной недостаточности Т 1/2 увеличивается в 2-3 раза, при циррозе печени - в 3-10 раз.

Показания

Наджелудочковая экстрасистолии.Желудочковая экстрасистолия.Пароксизмы мерцания и трепетания предсердий.Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия (в т.ч. при синдроме WPW).Пароксизмальная желудочковая тахикардия (при отсутствии органических поражений сердца).

Способ применения и дозы

Назначают внутрь по 25 мг (1 таб.) каждые 8 ч, при отсутствии терапевтического эффекта - через каждые 6 ч.Возможно увеличение разовой дозы до 50 мг (2 таб.) каждые 6-8 ч. Максимальная суточная доза - 300 мг (12 таб.).Продолжительность лечения и изменение режима дозирования (увеличение дозы) определяется врачом. Препарат принимают внутрь, после приема пищи, запивая небольшим количеством воды комнатной температуры, таблетки не измельчать.

Противопоказания

AV-блокада II и III степени (без кардиостимулятора).Хроническая сердечная недостаточность.Выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка (более 1.4 см). Наличие постинфарктного кардиосклероза.Выраженные нарушения функции печени. Выраженные нарушения функции почек.Беременность.Период лактации.Детский и подростковый возраст до 18 лет.Повышенная чувствительность к препарату.С осторожностью и под тщательным медицинским контролем, начиная лечение в условиях стационара, следует применять при:AV-блокаде I степени.Нарушении внутрижелудочковой проводимости.СССУ.Брадикардии.Тяжелых нарушениях кровообращения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Со стороны ЦНС и периферической нервной системыВозможны Головокружение, головная боль, ощущение тяжести в голове, атаксия , диплопия. Со стороны сердечно-сосудистой системыВозможны гиперемия кожных покровов, нарушения AV- и внутрижелудочковой проводимости, появление синусовой тахикардии (при длительном применении), аритмогенное действие.

Передозировка

Данные о передозировке Аллапинина не предоставлены.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с индукторами микросомальных ферментов печени эффективность Аллапинина снижается.Антиаритмические средства других классов повышают риск развития аритмогенного действия.Аллапинин усиливает действие недеполяризующих миорелаксантов.