Инструкция по применению
Аллергодил Спрей назальный 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Спрей
Страна: Германия
Производитель: Меда Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Азеластин
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Азеластин

Состав

В 1 флаконе (10 мл) содержится:активное вещество: азеластина гидрохлорид 0,01 г; вспомогательные вещества: гипромелоза, динатрия эдетат дигидрат, лимонная кислота безводная, натрия гидрофосфат додекагидрат, натрия хлорид, вода очищенная.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

Биодоступность после интраназального применения около 40 %. Максимальная концентрация (Cmax) в крови после интраназального применения достигается через 2-3 часа. При применении интраназально в рекомендованной суточной дозе 1.1 мг равновесная концентрация в крови составляет менее 1% от дозы (1 нг/мл). Концентрация препарата в сыворотке крови после интраназального применения в 8 раз ниже, чем после приема внутрь.У пациентов, страдающих аллергическим ринитом, концентрация в крови более высокая, чем у здоровых.Другие фармакокинетические данные изучены при применении внутрь.Связь с белками крови 80-90%. Метаболизируется в печени путем окисления с участием системы цитохрома Р450 с образованием активного метаболита дезметилазеластина. Выводится в основном почками в виде неактивных метаболитов.Период полувыведения (Т1/2) азеластина – около 20 ч, его активного метаболита дезметилазеластина – около 45 ч.

Показания

- Лечение сезонного и круглогодичного аллергического ринита (в т.ч. сенная лихорадка) и риноконъюнктивита.- Лечение симптомов вазомоторного (круглогодичного неаллергического) ринита, таких как заложенность носа, ринорея, чиханье, постназальный синдром.

Способ применения и дозы

Интраназально.Аллергический ринит и риноконъюнктивитПри отсутствии иных рекомендаций взрослым и детям 6 лет и старше - по одной дозе (140 мкг/0,14 мл) в каждый носовой ход два раза в день утром и вечером.При необходимости взрослым и детям старше 12 лет - по две дозы (280 мкг/0,28 мл) в каждый носовой ход два раза в день утром и вечером.Аллергодил применяется до прекращения симптомов и подходит для продолжительного применения, но не более 6 месяцев непрерывного лечения.Вазомоторный ринитВзрослым и детям старше 12 лет - по две дозы (280 мкг /0,28 мл) в каждый носовой ход два раза в день утром и вечером.Аллергодил применяется до прекращения симптомов и подходит для продолжительного применения, но не более 8 недель непрерывного лечения.Объем одного впрыскивания (одной дозы) составляет 0,14 мл и содержит 140 мкг активного вещества.Порядок применения1. Снимите защитный колпачок2. Перед первым использованием нажмите на распылитель 2 – 3 раза.3. В зависимости от назначенной дозы, впрысните по одному разу или по два раза в каждый носовой ход, держа голову прямо.4. Снова наденьте защитный колпачок.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к азеластину и/или другим компонентам препарата;- При аллергическом рините и риноконъюнктивите - детский возраст до 6 лет; при вазомоторном рините - детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

При испытании доз, многократно превышающих терапевтический диапазон, на животных не получено какого-либо свидетельства о тератогенном действии, но поскольку не имеется опыта применения азеластина у беременных и кормящих, не рекомендуется использование назального спрея азеластина во время беременности, а также в период лактации.

Побочные действия

Редко – слабое, преходящее раздражение воспаленной слизистой оболочки носа, проявляющееся жжением, зудом, чиханием, в редких случаях носовым кровотечением. В результате неправильного способа введения, когда голова запрокинута назад, возможно появление горького вкуса во рту, что в редких случаях может вызывать тошноту.Очень редко – аллергические реакции (сыпь, кожный зуд, крапивница), слабость, головокружение (может быть вызвано самим заболеванием).

Передозировка

На настоящий момент о случаях передозировки препарата при интраназальном применении неизвестно.

Взаимодействие с другими препаратами

При интраназальном применении азеластина не выявлено клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Особые указания

В отдельных случаях при употреблении назального спрея выявляется усталость, различной степени выраженности и слабость, которые могут быть вызваны также и основным заболеванием. В этих случаях не рекомендуется управлять автомобилем и работать с опасными механизмами. Употребление алкоголя может усилить эти явления.

Срок хранения после открытия

180.0

Условия хранения

В сухом месте