Инструкция по применению
Аллохол Таблетки 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Биосинтез
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Активированный уголь+Желчь+Крапивы двудомной листья+Чеснока посевного луковицы
Количество в упаковке: 1



Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой белого цвета, допускается легкий специфический запах. На поперечном разрезе видны два слоя, внутренний слой черного цвета с вкраплениями.

Действующее вещество

Активированный уголь+Желчь+Крапивы двудомной листья+Чеснока посевного луковицы

Состав

Одна таблетка, покрытая оболочкой, содержит: Действующие вещества: желчь сухая - 80,000 мг, чеснока посевного луковицы сушеные - 40,000 мг, крапивы двудомной листья - 5,000 мг, активированный уголь - 25,000 мг. Вспомогательные вещества: магния оксид, крахмал картофельный, тальк, полисорбат (твин-80), кальция стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, примогель, состав оболочки: сахароза (сахар), магния гидроксикарбонат (магния карбонат основной), титана диоксид, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский 12600+2700, К-17), тальк, парафин твердый, масло вазелиновое, воск пчелиный, полисорбат (твин-80).

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Действующие вещества препарата хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте. Холевая и хенодезоксихолевая кислоты, содержащиеся в препарате, подвергаются 7-альфа-дегидроксилированию в кишечнике. Хенодезоксихолевая кислота, кроме того, подвергается метаболизму в печени: конъюгирует с аминокислотами, секретируется в Желчь, откуда вновь выделяется в кишечник, затем частично реабсорбируется, остальная часть выводится через кишечник.

Показания

В составе комплексной терапии: хронический реактивный гепатит, холангит, бескаменный (некалькулезный) холецистит, дискинезия желчевыводящих путей по гипокинетическому типу, атонический запор, постхолецистэктомический синдром.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды. Взрослым - по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки. Детям старше 12 лет - по 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения 3-4 недели. При обострении заболеваний по 1 таблетке 2-3 раза в день в течение 1-2 месяцев. Повторные курсы лечения проводят с интервалом в 3 месяца после консультации врача. Перед применением препарата у детей следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, калькулезный холецистит, обтурационная желтуха, острый гепатит, острая и подострая дистрофия печени, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения), острый энтероколит, острый панкреатит, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период грудного вскармливания применение препарата возможно по рекомендации врача и только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, диарея, повышение активности "печеночных" трансаминаз в сыворотке крови. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. Возможные симптомы: диарея, тошнота, изжога, кожный зуд, повышение активности "печеночных" трансаминаз в крови. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препараты, содержащие алюминия гидроксид, колестирамин, колестипол снижают абсорбцию и уменьшают эффект препарата. Одновременный прием нецелесообразен. Одновременное применение препарата с холеретиками синтетического или растительного происхождения усиливает желчеобразование. Комбинация препарата со слабительными лекарственными средствами приводит к устранению запоров. Препарат способствует лучшему всасыванию жирорастворимых витаминов. Применение препарата с антисептиками или химиотерапевтическими средствами при инфекционных процессах в печени или желчных путях улучшает терапевтическую эффективность последних.

Особые указания

В состав препарата входит сахароза, что следует учитывать пациентам, с сахарным диабетом. В одной таблетке содержится около 0,1 г сахарозы (сахара), что соответствует 0,01 ХЕ, в максимальной суточной дозе препарата содержится около 0,8 г сахарозы (сахара), что соответствует 0,08 ХЕ. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.