Инструкция по применению
Аллохол-Реневал Таблетки покрытые оболочкой 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Активированный уголь+Желчь+Крапивы двудомной листья+Чеснока посевного луковицы
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 25 мг +80 мг +40 мг +5 мг

Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета, на поперечном разрезе видны три слоя.

Действующее вещество

Активированный уголь+Желчь+Крапивы двудомной листья+Чеснока посевного луковицы

Состав

Действующие вещества:Желчь (Желчь крупного рогатого скота сухая) - 80,000 мг, Чеснока посевного луковицы - 40,000 мг, Активированный уголь (Уголь активированный) - 25,000 мг, Крапивы двудомной листья - 5,000 мг.Вспомогательные вещества:Крахмал картофельный - 40,460 мг, Кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 10,920 мг, Магния оксид - 4,000 мг, Тальк - 2,520 мг, Кальция стеарат - 2,100 мг, Состав оболочки:Сахароза (сахар) - 109,895 мг, Магния карбонат основной - 62,361 мг, Повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный) - 2,382 мг, Тальк - 1,792 мг, Кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 1,667 мг, Титана диоксид - 1,667 мг, Воск пчелиный - 0,176 мг, Тропеолин О - 0,060 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Препарат хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте. Холевая и хенодезоксихолевая кислоты содержащиеся в препарате подвергаются 7-альфа-дегидроксилированию в кишечнике. Хенодезоксихолевая кислота кроме того подвергается метаболизму в печени: конъюгирует с аминокислотами секретируется в желчь откуда вновь выделяется в кишечник затем частично реабсорбируется, остальная часть выводится через кишечник.

Показания

В составе комплексной терапии: хронический реактивный гепатит холангит бескаменный (некалькулезный) холецистит дискинезия желчевыводящих путей по гипокинетическому типу атонический запор постхолецистэктомический синдром.

Способ применения и дозы

Внутрь после еды.Взрослым - по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки.Детям старше 12 лет - по 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения 3-4 недели.При обострении заболеваний по 1 таблетке 2-3 раза в день в течение 1-2 месяцев. Повторные курсы лечения проводят с интервалом в 3 месяца после консультации врача.Перед применением препарата у детей следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата калькулезный холецистит обтурационная желтуха острый гепатит острая и подострая дистрофия печени язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения) острый энтероколит острый панкреатит дефицит сахаразы/изомальтазы непереносимость фруктозы глюкозо- галактозная мальабсорбция детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции диарея, повышение активности "печеночных" трансаминаз в сыворотке крови. При появлении побочных эффектов необходимо прекратить прием и обратиться к врачу.

Передозировка

Возможны диарея тошнота изжога кожный зуд повышение активности "печеночных" трансаминаз в сыворотке крови.Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препараты содержащие алюминия гидроксид колестирамин колестипол снижают абсорбцию и уменьшают эффект препарата. Одновременный прием нецелесообразен.

Особые указания

В состав препарата входит сахароза что следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.В одной таблетке содержится около 01 г сахарозы (сахара) что соответствует 001 ХЕ, в максимальной суточной дозе препарата содержится около 08 г сахарозы (сахара) что соответствует 008 ХЕ.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.