Инструкция по применению
Аллокин-альфа Лиофилизат для подкожного введения введения 1 мг 3 шт

Характеристики



Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: ГНИИ ОЧБ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гистидил-глицил-валил-серил-глицил-гистидил-глицил
Количество в упаковке: 3
Дозировка действующего вещества: 1 мг

Действующее вещество

Гистидил-глицил-валил-серил-глицил-гистидил-глицил

Состав

Гистидил-глицил-валил-серил-глицил-гистидил-глицил-глутаминил-гистидил-глицил-валил-гистидил-глицин 1 мг

Форма выпуска

Ампулы

Показания

— хронический рецидивирующий герпес 1 и 2 типов . — в составе комплексной терапии среднетяжелой (желтушной) формы острого гепатита В.

Способ применения и дозы

Препарат вводят п/к. Стандартный курс лечения рецидива герпеса включает инъекции препарата в дозе 1 мг через день, всего на курс - 3 инъекции. При среднетяжелых формах острого гепатита В препарат вводят после верификации диагноза в дозе 1 мг 3 раза в неделю в течение 3-х недель (всего 9 инъекций). Для приготовления раствора для инъекций в качестве растворителя использовать 1 мл 0.9 % раствора натрия хлорида.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат протвопоказан при беременности и в период лактации.

Побочные действия

В отдельных случаях возможны слабость, головокружение, образование новых элементов сыпи (при герпетической инфекции).

Особые указания

В отдельных случаях возможны слабость, головокружение, образование новых элементов сыпи (при герпетической инфекции).