Инструкция по применению
Алмагель Суспензия для приема внутрь 10 мл 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суспензия
Страна: Болгария
Производитель: БалканФарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алгелдрат+Магния гидроксид
Количество в упаковке: 10

Действующее вещество

Алгелдрат+Магния гидроксид

Состав

10 мл (1 пакетик) суспензии содержат: действующие вещества: алюминия гидроксид гель 4 36 г (в пересчете на алюминия оксид 436 мг) магния гидроксид паста 700 мг (в пересчете на магния оксид 150 мг) вспомогательные вещества: водорода пероксида раствор 30 % - 0 82 мг сорбитол - 1602 30 мг гиэтеллоза - 21 80 мг метилпарагидроксибензоат - 21 80 мг пропилпарагидроксибензоат - 2 726 мг бутилпарагидроксибензоат - 2 726 мг натрия сахарината дигидрат - 1 636 мг пропиленгликоль - 654 00 мг макрогол 4000 - 436 00 мг лимона масло - 3 27 мг этанол 96 % - 196 20 мг вода очищенная до 10 мл.

Форма выпуска

Суспензия

Фармакокинетика

Алгелдрат Всасывание - резорбируются небольшие количества препарата Алмагель® которые практически не изменяют концентрацию солей алюминия в крови. Распределение - нет. Метаболизм - нет. Выведение - выводится через кишечник. Магния гидроксид Всасывание - ионы магния резорбируются в количестве около 10 % принятой дозы и не изменяют концентрации ионов магния в крови. Распределение - обычно локально. Метаболизм - нет. Выведение - выводится через кишечник.

Показания

Лечение Изжога и боли в эпигастрии после погрешностей в питании избыточного употребления этанола никотина кофе приема лекарственных средств раздражающих слизистую оболочку желудка. Острый гастрит хронический гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией желудка (в фазе обострения) острый дуоденит энтерит колит. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения). Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы гастроэзофагеальный рефлюкс рефлюксэзофагит дуоденогастральный рефлюкс. Симптоматические язвы желудочнокишечного тракта различного генеза эрозии слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ. Острый панкреатит обострение хронического панкреатита. Профилактика желудочных и дуоденальных нарушений уменьшение раздражающего и ульцерогенного действия связанного с приемом лекарственных препаратов раздражающих слизистую оболочку желудка.

Способ применения и дозы

Для приема внутрь. Лечение Взрослым и детям старше 15 лет По 5-10 мл (1-2 мерные ложки) или 1 пакетик 3 - 4 раза в сутки. При необходимости разовую дозу можно увеличить до 15 мл (3 мерные ложки). После достижения терапевтического эффекта суточную дозу уменьшают до 5 мл (1 мерная ложка) 3-4 раза в сутки или до 1 пакетика 1-2 раза в сутки в течение 15-20 дней. Детям от 10 до 15 лет Применяют в дозе равной половине дозы для взрослых - по 1 мерной ложке 2-4 раза в день или по 2 мерные ложки 1-2 раза в день или по 1 пакетику 1-2-раза в день. Препарат принимают через 45-60 минут после приема пищи и вечером перед сном. Не рекомендуется прием жидкостей в течение 15 минут после приема препарата Алмагель®. Перед каждым применением суспензию необходимо тщательно гомогенизировать встряхивая флакон или разминая и встряхивая пакетик. Профилактика По 5-15 мл (1-3 мерные ложки) или 1 пакетик за 15 минут до приема лекарственных препаратов с раздражающим действием.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему или к какомулибо вспомогательному веществу входящему в состав препарата. Тяжелая форма почечной недостаточности (клиренс креатинина < 30 мл/мин) изза риска развития гипермагниемии и алюминиевой интоксикации. Беременность. Болезнь Альцгеймера. Детский возраст до 10 лет. Редкая наследственная непереносимость фруктозы (содержит сорбитол). Выраженная гипофосфатемия.

Применение при беременности и кормлении грудью

Исследования на животных не показали наличия тератогенного потенциала или других нежелательных эффектов на эмбрион и/или плод. Нет клинических данных о применении препарата Алмагель® беременными женщинами. Препарат Алмагель® не рекомендуется принимать во время беременности но если польза от его применения превышает потенциальный риск для плода то продолжительность применения не должна превышать 5 - 6 дней под наблюдением врача. Нет данных о выделении действующих веществ препарата Алмагель® с грудным молоком. Препарат Алмагель® можно применять в период кормления грудью только после тщательной оценки соотношения пользы для матери и потенциального риска для новорожденного. В период кормления грудью продолжительность применения не должна превышать 5 - 6 дней под наблюдением врача.

Побочные действия

Нежелательные реакции систематизированы в соответствии с Классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): очень часто (⩾1/10) часто (⩾1/100 < 1/10) нечасто (⩾1/1000 <1/100) редко (⩾1/10000 <1/1000) очень редко (<1 /10000) частота неизвестна (невозможно определить исходя из доступных данных). Нарушения со стороны иммунной системы: редко - аллергические реакции. Нарушения со стороны обмена веществ и питания: очень редко - гипермагниемия1 (с сопутствующей артериальной гипотонией) частота неизвестна - гипофосфатемия гиперкальциурия. Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: частота неизвестна - остеомаляция. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: редко - тошнота рвота спазм желудка изменение вкусовых ощущений частота неизвестна - боль в животе1 запор (проходит после уменьшения дозы). При длительном применении препарата пациентами с почечной недостаточностью и пациентами находящимися на гемодиализе возможны изменения настроения и умственной активности. При длительном применении высоких доз препарата и дефиците фосфора в пище возможно возникновение остеомаляции. 1 Наблюдалась при длительном применении гидроксида магния у пациентов с почечной недостаточностью.

Передозировка

Симптомы: при однократном приеме дозы превышающей рекомендованную обычно не наблюдаются другие признаки передозировки кроме запора метеоризма ощущения металлического вкуса во рту. При продолжительном приеме высоких доз возможно образование камней в почках появление тяжелых запоров легкая сонливость гипермагниемия. Могут наблюдаться также признаки метаболического алкалоза: изменение настроения или умственной активности онемение или боль в мышцах раздражительность и быстрая утомляемость замедление дыхания неприятные вкусовые ощущения. Неотложные меры: в этих случаях необходимо сразу предпринять меры по быстрому выведению препарата из организма - промывание желудка стимуляция рвоты прием активированного угля. В случае передозировки требуется проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

Может абсорбировать некоторые лекарственные средства уменьшая таким образом их всасывание поэтому при одновременном применении других лекарственных средств их необходимо принимать за 1-2 часа до или после приема препарата Алмагель®. Препарат Алмагель® снижает кислотность желудочного сока и это может повлиять на действие большого числа лекарственных средств при одновременном применении. Препарат Алмагель® уменьшает всасывание блокаторов гистаминовых H2-рецепторов (циметидин ранитидин фамотидин) сердечных гликозидов наперстянки солей железа препаратов лития хинидина мексилетина фенотиазиновых препаратов антибиотиков тетрациклинового ряда ципрофлоксацина изониазида и кетоконазола. При одновременном применении препарата Алмагель® и лекарственных средств покрытых кишечнорастворимой оболочкой повышенный pH желудочного сока может привести к ускоренному разрушению их оболочки и вызвать раздражение желудка и двенадцатиперстной кишки. Препарат Алмагель® может повлиять на результаты некоторых лабораторных и функциональных исследований и тестов: он снижает уровень желудочной секреции при определении ее кислотности изменяет результаты тестов с использованием технеция (Tc99) например сцинтиграфия костей умеренно и на короткое время повышает сывороточный уровень гастрина повышает сывороточный уровень фосфора значения pH сыворотки и мочи. Вторичное по отношению к применению магния гидроксида повышение pH мочи может изменять выведение отдельных лекарственных средств. Например было отмечено повышение выведения салицилатов.

Особые указания

Не рекомендуется применение препарата Алмагель® пациентам с тяжелым запором при боли в желудке неясного происхождения и при подозрении на острый аппендицит при наличии язвенного колита дивертикулеза колостомии или илеостомии (повышенный риск нарушения водно-электролитного баланса) при хронической диарее остром геморрое при изменении кислотно-щелочного равновесия в организме а также при наличии метаболического алкалоза при циррозе печени тяжелой сердечной недостаточности при токсикозе беременных при нарушениях функции почек (КК < 30 мл/мин из-за риска развития гипермагниемии и алюминиевой интоксикации). При продолжительном приеме (более 14 дней) препарата Алмагель® пациентами с нарушением функции почек необходимо регулярное наблюдение врача и контроль сывороточного уровня магния. Препарат Алмагель® не содержит сахара что позволяет принимать его пациентам с сахарным диабетом. Препарат Алмагель® содержит сорбитол и противопоказан при редкой наследственной непереносимости фруктозы. Препарат Алмагель® содержит парагидроксибензоаты которые могут вызвать аллергическую реакцию (возможно замедленного типа) и очень редко - бронхоспазм. Препарат Алмагель® содержит 98 1 мг этанола в дозе 5 мл. Не рекомендуется применять людям страдающим алкоголизмом. Этанол может вызвать осложнения у беременных и кормящих грудью женщин детей и пациентов с нарушением функции печени и эпилепсией.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте!