
Инструкция по применению
Алоэ сок 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сок
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алоэ древовидного листья
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24

Действующее вещество

Алоэ древовидного листья

Состав

Сок из биостимулированных листьев или «деток» алоэ древовидного 80 мл; спирт этиловый 20 мл.

Форма выпуска

Сок

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Сок АЛОЭ показан внутрь при: хронических гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока; хронических колитах; в качестве слабительного средства для повышения сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям; для улучшения аппетита. Сок АЛОЭ наружно применяют при лечении: заболеваний кожных покровов и слизистых оболочек; гнойных ран, ожогов, остеомиелита, трофических язв; острого ринита; для полоскания полости рта.

Способ применения и дозы

Внутрь, за 20–30 минут до еды, по 1 ч. ложке 2–3 раза в сутки; наружно — в виде примочек и непосредственного орошения ран. Курс — 15–30 дней.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата; артериальная гипертензия; тяжелые формы нарушения функции печени и почек; метроррагия; геморрой; цистит; кровохарканье; холелитиаз; тяжелые сердечно-сосудистые заболевания; повышенное артериальное давление; острые желудочно-кишечные расстройства.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан к применению при беременности и кормлении грудью. Детский возраст (до 18 лет).

Побочные действия

Редко — аллергические реакции.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

При длительном применении алоэ возможно уменьшение содержания калия в организме, что может способствовать усилению действия сердечных гликозидов и антиаритмических препаратов. При одновременном применении алоэ и тиазидных диуретиков, "петлевых" диуретиков, препаратов солодки, кортикостероидов повышается риск развития дефицита калия. Алоэ потенцирует действие слабительных средств, а также препаратов, стимулирующих кроветворение.

Особые указания

При длительном применении алоэ возможно уменьшение содержания калия в организме, что может способствовать усилению действия сердечных гликозидов и антиаритмических препаратов.У детей в возрасте до 12 лет при необходимости применения алоэ требуется консультация врача; с осторожностью применять п/к.

Условия хранения

В сухом месте