Инструкция по применению
Алпизарин Таблетки 100 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вилар
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тетрагидроксиглюкопиранозил-ксантен
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 60

Действующее вещество

Тетрагидроксиглюкопиранозил-ксантен

Состав

Действующее вещество: Тетрагидроксиглюкопиранозилксантен (Tetrahydroxyglucopyranosilxanten);Концентрация действующего вещества (мг): 0,1 г

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Препарат при приеме внутрь быстро всасывается из ЖКТ.; В плазме крови неизмененный тетрагидроксиглюкопиранозилксантен определяется в течение 0,5-5 ч после применения.; Максимум концентрации тетрагидроксиглюкопиранозилксантена - 4,5 мкг/мл достигается через 1 час после его применения.; Тетрагидроксиглюкопиранозилксантен в значительной степени связывается с белками крови (90-70%).; Преобладают внепочечные пути выведения тетрагидроксиглюкопиранозилксантена. Экскреция неизмененного тетрагидроксиглюкопиранозилксантена почками за 24 ч не превышает 0,1 %.

Показания

В составе комбинированной терапии острых и рецидивирующих инфекций, вызванных вирусом простого герпеса различной локализации (в том числе генитальной); вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта (афтозный стоматит), опоясывающий лишай, герпетиформная экзема Капоши, цитомегаловирусная инфекция, ветряная оспа.;

Способ применения и дозы

Таблетки применяют независимо от приема пищи. Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1-2 таблетке 3-4 раза в сутки, детям 6-12 лет – по 1 таблетке 2-3 раза в сутки, детям 3-6 лет – по 1/2-1 таблетке 2-3 раза в сутки. Терапевтический эффект препарата наиболее выражен при его назначении в начальном периоде заболевания.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Беременнос ть.; Детский возраст до 3 лет. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных о выделении тетрагидроксиглюкопиранозилксантена в грудное молоко нет, поэтому применение препарата в период грудного вскармливания возможно только по жизненным показаниям, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходима консультация врача.; С осторожностью: период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.;

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. Возникновение передозировки маловероятно.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

В случае распространенных высыпаний, а также при наличии лихорадки, лимфоаденопатии и других общих явлениях применяют препарат Алпизарин таблетки 100 мг в комплексе с препаратом Алпизарин мазь для наружного и местного применения 2 % и 5 %.; 1 таблетка препарата содержит 0,1 г сахара молочного (лактозы) и 0,0475 г крахмала картофельного, что соответствует 0,01 ХЕ (хлебных единиц). Максимальная суточная доза препарата для детей от 3-х до 12-ти лет содержит 0,03 ХЕ; для детей старше 12-ти лет и взрослых - 0,08 ХЕ.; Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности или требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортом и работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении