Инструкция по применению
Алтея Сироп 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Флора Кавказа
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алтея лекарственного корней экстракт
Количество в упаковке: 1

Описание

Густая жидкость от светло-желтого до желтовато-коричневого цвета, с характерным запахом.

Действующее вещество

Алтея лекарственного корней экстракт

Состав

Активный компонент: Алтея корней экстракт сухой - 2,0 г (с содержанием суммы восстанавливающих сахаров в пересчете на глюкозу 1,0 %). Вспомогательные вещества: Сахароза (сахар) - 62,72 г, натрия бензоат- 0,38 г, вода очищенная - до 100 г.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, трахеобронхит, бронхит).

Способ применения и дозы

Внутрь. Детям до 12-лет - по 1 чайной ложке сиропа, предварительно разведённой в 1 /4 стакана тёплой воды, 4-5 раз в день после еды. Детям старше 12 лет и взрослым - по 1 столовой ложке сиропа, предварительно разведённой в 1/2 стакана тёплой воды, 4-5 раз в день после еды. Длительность лечения составляет 10-15 дней. Увеличение продолжительности и проведения повторных курсов лечения возможно после консультации с врачом. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применять препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Врожденная непереносимость фруктозы. Дефицит сахаразы, изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота. Лечение: отмена препарата, промывание желудка.

Взаимодействие с другими препаратами

Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в 1 чайной ложке сиропа содержится около 4,2 г сахарозы (0,35 ХЕ), в столовой ложке - около 16,8 г сахарозы (1,4 ХЕ). Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 2 недель или ухудшаются, следует обратиться к врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.