Инструкция по применению
Алтея сироп 95 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Биннофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алтея лекарственного корней экстракт
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 2

Описание

Густая жидкость от светло-желтого до желтовато-коричневого цвета, своеобразного запаха.

Действующее вещество

Алтея лекарственного корней экстракт

Состав

На 1000 мл:Активное вещество: Алтея лекарственного корней экстракт (алтея корней экстракт сухой) (с содержанием суммы восстанавливающих моносахаридов в пересчете на глюкозу - 1,0 %) - 25 г,вспомогательные вещества: натрия бензоат, сахароза (сахар), вода очищенная.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, трахеобронхит, бронхит).

Способ применения и дозы

Внутрь:Детям до 12 лет - по 1 чайной ложке сиропа, предварительно разведенной в 1 /4 стакана теплой воды, 4-5 раз в день после еды.Детям старше 12 лет и взрослым - по 1 столовой ложке сиропа, предварительно разведенной в 1/2 стакана теплой воды, 4-5 раз в день после еды. Длительность лечения составляет 10-15 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции.Если Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота.Лечение: отмена препарата, промывание желудка.

Взаимодействие с другими препаратами

Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Информация для больных сахарным диабетом: в 1 чайной ложке (5 мл) содержится 0,4 ХЕ (хлебных единиц), в 1 столовой ложке (15 мл) - 1,2 ХЕ.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами и занятиями другими опасными видами деятельности, требующими особого внимания и быстрых реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.Хранить в местах, недоступных для детей.