Инструкция по применению
Амбене Хондро Капсулы 500 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Промомед
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Хондроитина сульфат
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 500 мг



Описание

Амбене Хондро (капсулы) — современный хондропротектор, содержащий компонент натуральной хрящевой ткани (хондроитин), необходимый для построения и обновления суставного хряща.   Амбене Хондро обладает двойным действием: Убирает симптомы, уменьшая боль, хруст и дискомфорт в суставах. Восстанавливает структуру хряща, замедляя дальнейшее разрушение суставов и позвоночника. Амбене Хондро способствует подавлению воспалительной реакции, нормализует метаболизм в хрящевой ткани и стимулирует выработку синовиальной жидкости внутри суставов.

Действующее вещество

Хондроитина сульфат

Состав

Состав на 1 капсулу:Действующее веществоХондроитина сульфат натрия - 500,0 мгВспомогательные вещества:Тальк - 10,0 мгМасса содержимого капсулы - 510,0 мгКапсула твердая желатиновая Корпус капсулы:Титана диоксид - 2 %Желатин до 100 %Крышка капсулы:Титана диоксид - 2 %Желатин до 100 %

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Абсорбция и распределениеБолее 70 % хондроитина сульфата всасывается в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). При однократном приёме внутрь средней терапевтической дозы препарата максимальная концентрация (Cmax) хондроитина сульфата в плазме крови отмечается через 3-4 ч, в синовиальной жидкости через 4-5 ч. Абсорбированный в желудочно-кишечном тракте препарат накапливается в синовиальной жидкости. Биодоступность препарата составляет 13 %. Выведение Выводится почками.

Показания

Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника: остеоартроз, остеохондроз позвоночника.

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая водой.Взрослым и подросткам старше 15 лет назначают:Капсулы по 500 мг: по 1 капсуле 2 раза в день.Рекомендуемая продолжительность начального курса лечения 6 месяцев. Период действия препарата после его отмены - 3-5 месяцев в зависимости от локализации и стадии заболевания. Продолжительность повторных курсов лечения устанавливается врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 15 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано в связи с отсутствием данных.

Побочные действия

Частота возникновения нежелательных лекарственных реакций определена в соответствии с классификацией ВОЗ: очень часто (>1/10), часто (>1/100, 1/1000, 1 /10000, Нарушения со стороны иммунной системы: редко - аллергические реакции (крапивница, эритема, кожный зуд).Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: редко - тошнота, рвота.

Передозировка

В редких случаях возможны симптомы передозировки: тошнота, рвота, диарея. При длительном приеме чрезмерно высоких доз (свыше 3 г в сутки) возможна геморрагическая сыпь.Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении хоидроитина сульфата с другими лекарственными средствами возможно усиление действия непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов, фибринолитиков.Хондроитин сульфат совместим с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) и глюкокортикостероидами.

Особые указания

Не следует превышать рекомендованную дозу. С осторожностью следует назначать пациентам с кровотечениями, а также пациентам со склонностью к кровотечениям. Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмамиПрепарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.