Инструкция по применению
Амелотекс Гель для наружного применения 1 % 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мелоксикам
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%



Действующее вещество

Мелоксикам

Состав

100 г мелоксикам (в пересчете на 100% вещество) 1 г. Вспомогательные вещества: натрия метабисульфит - 0.4 мг, вода д/и - до 1 мл.

Форма выпуска

Гель

Показания

Симптоматическая терапия остеоартроза, сопровождающегося болевым синдромом. Применяется для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления . на прогрессирование заболевания не влияет.

Способ применения и дозы

Наружно. Не применять внутрь. Полоску геля длиной около 4 см (2 г) наносят 2 раза /сут тонким слоем на чистую сухую кожу над очагом поражения и слегка втирают в течение 2-3 мин. Длительность курса терапии определяется индивидуально, может варьировать в зависимости от места поражения и отмечаемого терапевтического эффекта и составляет не более 4 недель.

Противопоказания

Полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других НПВС (в т.ч. в анамнезе). Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения — детский и подростковый возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). Беременность. Повышенная чувствительность к мелоксикаму и другим компонентам препарата (в т.ч. к другим НПВС). С осторожностью следует применять препарат при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения), желудочно-кишечном кровотечении, прогрессирующих заболеваниях почекпеченочной недостаточности тяжелой степени или активном заболевании печениподтвержденной гиперкалиемиивоспалительных заболеваниях кишечниканарушении коагуляциихронической сердечной недостаточностиу пациентов пожилого возраста.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Для препаратов из группы НПВС для наружного применения описаны следующие побочные эффекты. Со стороны кожных покровов: гиперемия, папулезно-везикулезные высыпания, шелушение, фотосенсибилизация. Аллергические реакции: зуд и жжение кожи, многоформная эритема, крапивница, системные анафилактические реакции. При возникновении побочных реакций, в т.ч. не указанных выше, пациенту следует прекратить применение геля и сообщить лечащему врачу.

Особые указания

Для препаратов из группы НПВС для наружного применения описаны следующие побочные эффекты. Со стороны кожных покровов: гиперемия, папулезно-везикулезные высыпания, шелушение, фотосенсибилизация. Аллергические реакции: зуд и жжение кожи, многоформная эритема, крапивница, системные анафилактические реакции. При возникновении побочных реакций, в т.ч. не указанных выше, пациенту следует прекратить применение геля и сообщить лечащему врачу.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.