Инструкция по применению
Аминалон Таблетки 250 мг 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Беларусь
Производитель: Борисовский Завод Медицинских Препаратов
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гамма-аминомасляная кислота
Количество в упаковке: 1

Описание

Таблетки, покрытые оболочкой белого или почти белого цвета, двояковыпуклые. На поперечном разрезе видны два слоя с заметной границей между ними. Внутренний слой белого цвета с мраморными вкраплениями, наружный слой белого или почти белого цвета.

Действующее вещество

Гамма-аминомасляная кислота

Состав

Одна таблетка содержит: действующее вещество: гамма-аминомасляная кислота - 250 мг, вспомогательные вещества: повидон К 25, магния стеарат, сахароза. Состав оболочки: опадрай II*, сахароза, мука пшеничная хлебопекарная, магния карбонат основной, легкий, титана диоксид Е 171, воск пчелиный, желтый, парафин твердый, подсолнечное масло рафинированное. Состав опадрая II*: спирт поливиниловый, частично гидролизованный, тальк, макрогол 3350 (полиэтиленгликоль), лецитин (соевый), титана диоксид Е171.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция - быстрая, достаточно полная. Время достижения максимальной концентрации в плазме крови - 60 мин, затем концентрация быстро снижается и через 24 ч не определяется.

Показания

Остаточные явления черепно-мозговой травмы, инсульта, цереброваскулярная недостаточность, энцефалопатии различного генеза, алкогольная энцефалопатия, алкогольная полинейропатия, детский церебральный паралич, последствия черепно-мозговой родовой травмы у детей старше 3 лет, умственная отсталость, симптомокомплекс укачивания (морская и воздушная болезнь).

Способ применения и дозы

Внутрь, до еды. Суточная доза для взрослых - 3-3,75 г, для детей 4-6 лет - 2-3 г/сут, старше 7 лет - 3 г/сут. Суточную дозу делят на 3 приема. Лечение проводится длительно (от 2-3 нед до 2-4 мес). При остаточных явлениях черепно-мозговой травмы, инсульта, цереброваскулярной недостаточности и энцефалопатии различного генеза в зависимости от характера и тяжести заболевания назначают по 0,25-0,5-1,0 г 3 раза в день в течение 1-3 мес. При алкогольной энцефалопатии и полинейропатии дозы и продолжительность лечения устанавливаются индивидуально. При последствиях черепно-мозговой родовой травмы и умственной отсталости у детей аминалон назначают в высоких дозах (2-3 г/сут) в течение 2-3 мес. С целью профилактики и лечения синдрома укачивания взрослым - 0,5 г, детям - 0,25 г непосредственно перед пользованием транспортными средствами, либо 3 раза в день в течение 3-4 суток.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет, острая почечная недостаточность, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, целиакия.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан в I триместре беременности и в период грудного вскармливания. Применение во II и III триместре беременности возможно по назначению лечащего врача.

Побочные действия

Тошнота, рвота, бессонница, лабильность АД, диспепсия, гипертермия, усиливаются дозозависимые побочные эффекты, могут развиваться аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции возможных побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При передозировке усиливаются дозозависимые побочные эффекты, т.к. аллергические реакции, описанные в разделе Побочное действие , носят дозонезависимый характер. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает действие бензодиазепинов, многих снотворных и противоэпилептических средств.

Особые указания

В первые дни лечения возможны колебания артериального давления (АД). В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Не применять по истечении срока годности.