Инструкция по применению
Аминалон Таблетки покрытые оболочкой 250 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Органика
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гамма-аминомасляная кислота
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 250 мг



Действующее вещество

Гамма-аминомасляная кислота

Состав

Гамма-аминомасляная кислота 250 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция быстрая. Малотоксична для человека. Максимальная концентрация препарата в плазме наблюдается через 60 минут, затем быстро снижается. Элиминируется из плазмы в течение 24-х часов, после этого времени не определяется в плазме крови. Элиминация преимущественно почками в неизменном виде. В экспериментах на животных гамма-аминомасляная кислота не обладала способностью проникать через гематоэнцефалический барьер.

Показания

Гамма-аминомасляная кислота находит применение преимущественно в лечении больных старческого и пожилого возраста - в реабилитации после перенесенного нарушения мозгового кровообращения. Перенесенные травмы головного мозга - для повышения двигательной и психической активности больных. У детей при отставании умственного развития с пониженной психической активностью. При последствиях алкоголизма - алкогольная энцефалопатия, полиневрит, слабоумие. Эндогенная депрессия с преобладанием астено-ипохондрических явлений и затруднением умственной деятельности.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь до еды по 0,25 г. В зависимости от характера нозологии взрослым назначают 0,5-1,25 (2-5 таблеток) 3 раза в день. Максимальная суточная доза 4 г, максимальная разовая - 1,5 г. Применение у детей В зависимости от возраста детям назначают 0,5-3 г в сутки равными порциями. Курс лечения от 2-х недель до 6 месяцев в зависимости от тяжести заболевания и переносимости препарата.

Противопоказания

Гиперчувствительность, детский возраст до 1 года, острая почечная недостаточность, беременность (I триместр) и период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан в I триместре беременности и в период лактации. Применение во II и III триместрах беременности возможно по назначению лечащего врача.

Побочные действия

Гамма-аминомасляная кислота весьма малотоксична. Больными разного возраста переносится хорошо. Иногда возможны нарушения пищеварения, бессонница, ощущение жара, колебания артериального давления, что однако наблюдается только в первые дни лечения. Необходимо снизить дозу, после чего эти явления обычно быстро исчезают.

Передозировка

Симптомы: усиление выраженности побочных эффектов. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает действие бензодиазепинов, многих снотворных и противоэпилептических средств.