Инструкция по применению
Аминалон Таблетки 250 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Великобритания
Производитель: Борисовский Завод Медицинских Препаратов
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гамма-аминомасляная кислота
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 250 мг



Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. На поперечном разрезе ядро белого или почти белого цвета.

Действующее вещество

Гамма-аминомасляная кислота

Состав

Действующее вещество Гамма-аминомасляная кислота 250,0 мг Вспомогательные вещества Сахароза (Сахар белый) 27,2 мг Магния стеарат 2,8 мг Состав оболочки Опадрай II 85F18422 белый (Поливиниловый спирт – 5,6 мг, Титана диоксид – 3,5 мг, Макрогол (полиэтиленгликоль) – 2,83 мг, Тальк – 2,07 мг) 14,0 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция – быстрая, достаточно полная. Время достижения максимальной концентрации в плазме крови – 60 мин, затем концентрация быстро снижается и через 24 ч не определяется.

Показания

Остаточные явления черепно-мозговой травмы, инсульта, цереброваскулярная недостаточность, энцефалопатии различного генеза, алкогольная энцефалопатия, алкогольная полинейропатия, детский церебральный паралич, последствия черепно-мозговой родовой травмы у детей старше 3 лет, умственная отсталость, симптомокомплекс укачивания (морская и воздушная болезнь).

Способ применения и дозы

Внутрь, до еды. Суточная доза для взрослых – 3-3,75 г, для детей 4-6 лет – 2-3 г/сут, старше 7 лет – 3 г/сут. Суточную дозу делят на три приема. Лечение проводится длительно (от 2-3 нед до 2-4 мес). При остаточных явлениях черепно-мозговой травмы, инсульта, цереброваскулярной недостаточности и энцефалопатии различного генеза в зависимости от характера и тяжести заболевания назначают по 0,25-0,5-1,0 г 3 раза в день в течение 1-3 мес. При алкогольной энцефалопатии и полинейропатии дозы и продолжительность лечения устанавливаются индивидуально. При последствиях черепно-мозговой родовой травмы и умственной отсталости у детей аминалон назначают в высоких дозах (2-3 г/сут) в течение 2-3 мес. С целью профилактики и лечения синдрома укачивания взрослым – 0,5 г, детям – 0,25 г непосредственно перед пользованием транспортными средствами, либо 3 раза в день в течение 3-4 суток.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3х лет, острая почечная недостаточность, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, целиакия.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан в I триместре беременности и в период лактации. Применение во II и III триместре беременности возможно по назначению лечащего врача.

Побочные действия

Тошнота, рвота, бессонница, лабильность АД, диспепсия, гипертермия, усиливаются дозозависимые побочные эффекты, могут развиваться аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: при передозировке усиливаются дозозависимые побочные эффекты, т.к. аллергические реакции, описанные в разделе «Побочное действие», носят дозонезависимый характер. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Особые указания

В первые дни лечения возможны колебания артериального давления (АД). Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.