Инструкция по применению
Аминоплазмаль е раствор для инфузий 10% 500мл N10

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Б.Браун Медикал АГ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 10%



Описание

Основное терапевтическое воздействие Аминоплазмаля Б. Браун Е 10 заключается в снабжении организма субстратом синтеза белков при парентеральном питании.

Действующее вещество

Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты

Состав

аланин 10.5 г аргинин 11.5 г аспарагиновая кислота 5.6 г валин 6.2 г гистидин 3 г глицин 12 г глутаминовая кислота 7.2 г изолейцин 5 г калия ацетат 2.453 г лейцин 8.9 г лизина гидрохлорид 8.56 г, что соответствует содержанию лизина 6.85 г магния хлорида гексагидрат 508 мг метионин 4.4 г натрия ацетата тригидрат 2.858 г натрия гидроксид 360 мг натрия гидрофосфата додекагидрат 3.581 г пролин 5.5 г серин 2.3 г гацетилцистеин (200 мг/л), лимонной кислоты моногидрат, вода д/и. треонин 4.2 г триптофан 1.6 г фенилаланин 4.7

Форма выпуска

Раствор

Показания

травмы средней и тяжелой степени, политравма, ожоги, перитонит, сепсис, полиорганная недостаточность в соответствии с метаболическими потребностями, состояния после обширных оперативных вмешательств, воспалительные заболевания кишечника (в т.ч. болезнь Крона, язвенный колит), кишечные свищи, нарушения питания различного генеза (кахексия).

Способ применения и дозы

Взрослым и детям с 14 лет: Средняя суточная доза: 10-20 мл/кг массы тела, что соответствует 1-2 г аминокислот/кг массы тела, 700-1400 мл препарата для пациента с массой тела 70 кг. Высшая суточная доза: 20 мл/кг массы тела, что соответствует 2 г аминокислот/кг массы тела, 140 г аминокислот или 1400 мл препарата для пациента с массой тела 70 кг. Максимальная скорость введения: 1 мл/кг массы тела/час, что соответствует 0.1 г аминокислот/кг массы тела/час, 25 капель/мин или 1.17 мл/мин для Пациента с массой тела 70 кг. Детям Указанные ниже дозы являются усредненными. Доза должна подбираться в соответствии с возрастом ребенка, стадией и выраженностью заболевания. Для детей с 2 до 5 лет: 15 мл /кг массы тела, что соответствует 1.5 г аминокислот/кг массы тела. Для детей с 5 до 14 лет: 10 мл /кг массы тела, что соответствует 1.0 г аминокислот/кг массы тела. Максимальная скорость введения: 1 мл/кг массы тела/ час, что соответствует 0.1 г аминокислот/кг массы тела/ час. Продолжительность применения: Ограничений по продолжительности использования препарата не выявлено.

Противопоказания

врожденные нарушения аминокислотного метаболизма, тяжелые нарушения кровообращения (шок), выраженная гипоксия, выраженный метаболический ацидоз, прогрессирующая печеночная недостаточность, острая почечная недостаточность, если невозможно проведение гемофильтрации или гемодиализа, превышение предельно допустимой концентрации электролитов, входящих в состав препарата, в плазме крови, детский возраст до 2 лет, общие противопоказания для проведения инфузионной терапии (декомпенсированная сердечная недостаточность, острый отек легких, гипергидратация), гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат протвопоказан при беременности и в период лактации.

Побочные действия

При соблюдении рекомендаций в отношении указанных мер предосторожности, скорости введения и дозировки, побочных эффектов не наблюдается, однако возможно развитие аллергических реакций. Редко возникающие побочные эффекты (⩾ 1:1000, < 1:100): тошнота, рвота, головная боль, озноб, лихорадка могут быть связаны с началом проведения парентерального питания и не являются специфичными для Аминоплазмаля Б. Браун Е 10.

Передозировка

Передозировка или слишком быстрое введение препарата могут повлечь за собой такие явления, как озноб, тошнота, рвота и повышение экскреции аминокислот почками. В таких случаях введение препарата должно быть прекращено и возобновлено позже с меньшей скоростью инфузии.

Взаимодействие с другими препаратами

Одновременное применение больших доз препарата и других средств не изучено

Особые указания

Для обеспечения полного усвоения аминокислот, введение Аминоплазмаля Б. Браун Е 10 следует проводить одновременно с препаратами, обеспечивающими энергетические потребности организма (жировыми эмульсиями и растворами углеводов), а также электролитами, витаминами и микроэлементами.