Инструкция по применению
Амintакс суппозитории вагинальные 10 шт



Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Альтфарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Неомицин+Нистатин+Полимиксин B
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 35000 МЕ+100000 МЕ+35000 МЕ

Описание

Суппозитории желтого цвета, торпедообразной формы. Допускается наличие воздушного стержня и/или воронкообразного углубления.

Действующее вещество

Неомицин+Нистатин+Полимиксин B

Состав

Состав на один суппозиторий:Действующие вещества: неомицин - 35000 МЕ, нистатин - 100000 МЕ, полимиксин B - 35000 МЕ.Вспомогательные вещества: макрогол 400 и макрогол 1500 в соотношении (5:95) до получения суппозитория массой 2400 мг.

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

Равномерно распределяется по слизистой влагалища оказывая местное бактерицидное и фунгицидное действие. Практически не всасывается с поверхности слизистой влагалища.

Показания

Лечение.Инфекционно-воспалительные заболевания вызванные чувствительными микроорганизмами: неспецифические грибковые смешанные вагиниты вульвовагиниты и цервиковагиниты.Профилактика.Предоперационная профилактика инфекционных осложнений при гинекологических вмешательствах, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными диагностическими процедурами, перед родами.

Способ применения и дозы

Состав на один суппозиторий:Действующие вещества: неомицин - 35000 МЕ, нистатин - 100000 МЕ, полимиксин В - 35000 МЕ.Вспомогательные вещества: макрогол 400 и макрогол 1500 в соотношении (5:95) до получения суппозитория массой 2400 мг.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.I триместр беременности.Период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение в период беременности во II и III триместрах возможно только по назначению врача в тех случаях когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.При необходимости применения препарата в период лактации кормление грудью прекращают.В период грудного вскармливания применение препарата противопоказано.

Побочные действия

Аллергические реакции жжение зуд раздражение во влагалище. Аллергическая контактная экзема. При длительном применении возможно системное проявление побочных действий аминогликозидов.Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

Аллергические реакции жжение зуд раздражение во влагалище. Аллергическая контактная экзема. При длительном применении возможно системное проявление побочных действий аминогликозидов.Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Перед применением препарата необходимо предварительное взятие мазка и проведение бактериологического анализа.В случае почечной недостаточности обратитесь за консультацией к врачу. Сроки применения препарата должны быть ограничены с целью предупреждения формирования устойчивости к нему отдельных возбудителей заболеваний и риска реинфекции.Во время лечения не рекомендуется использовать колпачки и презервативы из латекса. Существует риск разрыва презерватива или диафрагмы. Не рекомендуется применение в сочетании со спермицидами возможно снижение активности препарата.Не следует прерывать курс лечения во время менструации.Во время лечения необходимо воздерживаться от применения внутривлагалищных тампонов.В случае местной непереносимости развития аллергической реакции появления побочных эффектов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.Если клинические признаки инфекции сохраняются после завершения лечения следует провести повторное микробиологическое исследование с целью подтверждения диагноза.В период лечения рекомендуется воздерживаться от половых контактов.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.