Инструкция по применению
Амизон Таблетки покрытые оболочкой 250мг N20

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Украина
Производитель: Фармак
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метилбензилкарбамидопиридиния йодид
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 250 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Метилбензилкарбамидопиридиния йодид

Состав

1 таб. энисамия йодид 250 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (200) - 11 мг, целлюлоза микрокристаллическая 101 - 21 мг, повидон К17 - 9 мг, кроскармеллоза натрия - 6 мг, кальция стеарат - 3 мг, Opadry II 85F Clear - 10 мг (полиэтиленгликоль - 1.5 мг, полисорбат 80 - 0.3 мг, поливиниловый спирт - 5.2 мг, тальк - 3 мг).

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь метилбензилкарбамидопиридиния йодид быстро попадает в кровь, Cmax метилбензилкарбамидопиридиния йодида наблюдается через 2-2.5 ч. T1 /2 составляет 13.5-14 ч, метаболизируется в печени, но быстро выводится из тканей (период полувыведения составляет 2-3 ч). Выводится из организма на 90-95% через почки с мочой в виде метаболитов.

Способ применения и дозы

Внутрь после еды, не разжевывая по 0.5 г 3 раза/сут. Максимальная разовая доза - 1 г, суточная - 2 г. Рекомендованный курс лечения от 5 до 7 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Детский возраст до 18 лет, беременность, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью.

Побочные действия

Горечь во рту, изжога, чувство жжения в горле, легкий отек слизистой оболочки ротовой полости, что не требует дополнительного лечения или отмены препарата. Препарат хорошо переносится, по данным клинических исследований, частота побочных реакций составляет 6%.

Передозировка

При передозировке препарата возможно усиление побочных эффектов, описанных в соответствующем разделе. При их появлении проводят промывание желудка, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами достаточно не изучено.

Особые указания

Прием препарата Амизон не влияет на способность управлять транспортом и различным механическим оборудованием.

Условия хранения

В сухом месте