Инструкция по применению
Амлорус таблетки 5 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Синтез
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Амлодипин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 5 мг



Действующее вещество

Амлодипин

Состав

1 таб. амлодипин (в форме безилата) 5 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 63.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

— артериальная гипертензия (монотерапия или в комбинации с другими гипотензивными средствами) — стабильная стенокардия напряжения, вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала) (монотерапия или в комбинации с другими антиангинальными средствами).

Противопоказания

— тяжелая артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.) — кардиогенный шок — острый инфаркт миокарда в течение первых 28 дней — нестабильная стенокардия (за исключением вазоспастической/стенокардии Принцметала) — обструкция выносящего тракта левого желудочка (включая клинически значимый стеноз аорты) — возраст до 18 лет — непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция — повышенная чувствительность к амлодипину, другим производным дигидропиридина и другим компонентам препарата. С осторожностью: нарушение функции печени, синдром слабости синусового узла (выраженная брадикардия, тахикардия), хроническая сердечная недостаточность неишемической этиологии III-IV функционального класса по классификации NYHA, артериальная гипотензия, аортальный стеноз, митральный стеноз, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, пожилой возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность применения амлодипина при беременности не установлена, поэтому применение при беременности возможно только в том случае, когда польза применения для матери превышает потенциальный риск для плода. Отсутствуют данные, свидетельствующие об экскреции амлодипина с грудным молоком. Однако известно, что другие блокаторы медленных кальциевых каналов - производные дигидропиридина, экскретируются с грудным молоком. В связи с чем, при необходимости назначения препарата Амлорус . в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Женщины детородного возраста должны использовать надежные методы контрацепции.

Побочные действия

Под частотой побочных реакций понимается: очень часто (&#8805 .1/10) . часто (&#8805 .1/100, меньше1/10) . нечасто (&#8805 .1/1000, меньше1/100) . редко (&#8805 .1/10 000, меньше1/1000) . очень редко (меньше1/10 000), включая отдельные сообщения. Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто - периферические отеки (лодыжек и стоп), ощущение сердцебиения, ощущение жара и "приливов" крови к коже лица . нечасто - чрезмерное снижение АД, ортостатическая гипотензия, васкулит . редко - развитие или усугубление течения хронической сердечной недостаточности . очень редко - нарушения ритма сердца (включая брадикардию, желудочковую тахикардию и мерцание предсердий), инфаркт миокарда, боль в грудной клетке. Со стороны ЦНС: часто - повышенная утомляемость, головокружение, головная боль, сонливость, мигрень . нечасто - общее недомогание, обморок, повышенное потоотделение, астения, гипестезии, парестезии, периферическая невропатия, тремор, бессонница, лабильность настроения, необычные сновидения, нервозность, депрессия, тревога . редко - судороги, апатия, ажитация . очень редко - атаксия, амнезия. Со стороны органов чувств: нечасто - звон в ушах, нарушения зрения, боль в глазах, диплопия, ксерофтальмия, конъюнктивит, нарушение аккомодации, извращение вкуса . очень редко - паросмия. Со стороны пищеварительной системы: часто - боль в животе, тошнота . нечасто - рвота, запор, метеоризм, диспепсия, диарея, анорексия, сухость слизистой оболочки полости рта, жажда . редко - гиперплазия десен, повышение аппетита . очень редко - гастрит, панкреатит, гипербилирубинемия, желтуха (обычно холестатическая), повышение активности печеночных трансаминаз, гепатит. Со стороны мочевыделительной системы: нечасто - учащенное мочеиспускание, болезненное мочеиспускание, никтурия, импотенция . очень редко - дизурия, полиурия. Со стороны дыхательной системы: нечасто - одышка, ринит, носовое кровотечение . очень редко - кашель. Со стороны костно-мышечной системы: нечасто - артралгия, судороги мышц, миалгия, боль в спине, артроз . редко - миастения. Со стороны кожных покровов: нечасто - алопеция . редко - дерматит . очень редко - нарушение пигментации кожи, ксеродермия. Со стороны органов кроветворения: очень редко - тромбоцитопеническая пурпура, лейкопения, тромбоцитопения. Со стороны обмена веществ: очень редко - гипергликемия. Аллергические реакции: нечасто - кожный зуд, сыпь . очень редко - ангионевротический отек, многоформная эритема, крапивница. Прочие: нечасто - гинекомастия, увеличение/снижение массы тела, озноб . очень редко - холодный пот.

Особые указания

Под частотой побочных реакций понимается: очень часто (&#8805 .1/10) . часто (&#8805 .1/100, меньше1/10) . нечасто (&#8805 .1/1000, меньше1/100) . редко (&#8805 .1/10 000, меньше1/1000) . очень редко (меньше1/10 000), включая отдельные сообщения. Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто - периферические отеки (лодыжек и стоп), ощущение сердцебиения, ощущение жара и "приливов" крови к коже лица . нечасто - чрезмерное снижение АД, ортостатическая гипотензия, васкулит . редко - развитие или усугубление течения хронической сердечной недостаточности . очень редко - нарушения ритма сердца (включая брадикардию, желудочковую тахикардию и мерцание предсердий), инфаркт миокарда, боль в грудной клетке. Со стороны ЦНС: часто - повышенная утомляемость, головокружение, головная боль, сонливость, мигрень . нечасто - общее недомогание, обморок, повышенное потоотделение, астения, гипестезии, парестезии, периферическая невропатия, тремор, бессонница, лабильность настроения, необычные сновидения, нервозность, депрессия, тревога . редко - судороги, апатия, ажитация . очень редко - атаксия, амнезия. Со стороны органов чувств: нечасто - звон в ушах, нарушения зрения, боль в глазах, диплопия, ксерофтальмия, конъюнктивит, нарушение аккомодации, извращение вкуса . очень редко - паросмия. Со стороны пищеварительной системы: часто - боль в животе, тошнота . нечасто - рвота, запор, метеоризм, диспепсия, диарея, анорексия, сухость слизистой оболочки полости рта, жажда . редко - гиперплазия десен, повышение аппетита . очень редко - гастрит, панкреатит, гипербилирубинемия, желтуха (обычно холестатическая), повышение активности печеночных трансаминаз, гепатит. Со стороны мочевыделительной системы: нечасто - учащенное мочеиспускание, болезненное мочеиспускание, никтурия, импотенция . очень редко - дизурия, полиурия. Со стороны дыхательной системы: нечасто - одышка, ринит, носовое кровотечение . очень редко - кашель. Со стороны костно-мышечной системы: нечасто - артралгия, судороги мышц, миалгия, боль в спине, артроз . редко - миастения. Со стороны кожных покровов: нечасто - алопеция . редко - дерматит . очень редко - нарушение пигментации кожи, ксеродермия. Со стороны органов кроветворения: очень редко - тромбоцитопеническая пурпура, лейкопения, тромбоцитопения. Со стороны обмена веществ: очень редко - гипергликемия. Аллергические реакции: нечасто - кожный зуд, сыпь . очень редко - ангионевротический отек, многоформная эритема, крапивница. Прочие: нечасто - гинекомастия, увеличение/снижение массы тела, озноб . очень редко - холодный пот.